

EXPLICATION DES FIGURES.

1-5. *Thaumastometra Montandoni* Kirk.

1. Abdomen (en dessus) ♂: *d.* coxe postérieure; *f.* métapleure; *c.* melanotum.

2. Le même (en dessous): *e.* mesonotum.

3. 9^e segment abdominal ♂ (ventral).


4. Abdomen (ventral) ♀: *a.* coxe intermédiaire; *b.* mésopleure; *d.* coxe postérieure.

5. Eperon sur le sommet (à côté) du tibia antérieur ♂ et ♀.

6. OEuf de *Corixa mercenaria* Say: *a.* mycropyle.

7. OEuf de *Notonecta americana* Fabr.: *a.* mycropyle.

Toutes ces figures sont grossies.



STAPHYLINIDES NOUVEAUX DE BARBARIE

Par ALBERT FAUVEL.

1. *Achenium medeanense* *.

Coloration d'un testacé-rougeâtre vif comme celle du *subcœcum* Woll., des Canaries, mais d'un tiers plus grand; antennes plus longues; yeux moitié plus gros, plus saillants, à facettes bien plus grosses; ponctuation générale de la tête, du corselet et des élytres moitié plus serrée et bien plus marquée, nettement entremêlée à la tête et au corselet de petits points nombreux (on en voit à peine quelques-uns sur la tête et le corselet du *subcœcum*); corselet moins régulièrement obconique, plus arrondi aux angles postérieurs; ponctuation de l'abdomen trois fois plus forte et râpeuse. — Long., 7 mill.

Medeah (Gray). — Ma collection.

Le seul exemplaire que je connais de cette espèce était dans la collection que j'ai acquise de W. Rothschild, de Tring.

Le *subcœcum*, dont j'ai vu le type unique au Musée de South Kensington, a le faciès et la ponctuation d'un *tenellum* Er. immature; mais ses yeux très petits et ses élytres très courtes l'en distinguent de prime abord; sa longueur est de 6 mill. Sa taille moindre, ses yeux microscopiques, sa ponctuation écartée à l'avant-corps et la brièveté de ses élytres le différencient aussi facilement du *myops* Fvl., d'Algérie.

J'ajoute que le *medeanense* a la tête plus courte, relativement plus large, plus fortement ponctuée, enfin les élytres bien plus courtes, plus densément et plus fortement ponctuées que le *myops*, dont les yeux sont un peu plus petits.

2. *Xantholinus laniger* *.

Ad sectionem *X. rufipedis* Luc., *linearis* Grav. et *græci* Kr. referendus; magnitudine *græci*, niger, nitidissimus, elytris ænescentibus, ore, antennis pedibusque rufis, palpis, antennarum articulo 11^o fere toto tarsisque rufo-testaceis, femoribus aliquando præter apicem piceolis; cæterum corporis, præsertim antici, pilositate prælonga, parum lanuginosa, partim nigritula, partim fulva, necnon capite thoraceque in fundo politis, minime alutaceis, in-

signis; a *græco* præsertim colore, pilositate, capite haud alutaceo-punctis utrinque parerioribus notato, basi magis truncato, oculis sat minoribus, thorace angusto, capite angustiore, ab angulis anticis ad apicem magis attenuato, punctis inter series dorsales et latera confusis, elytris brevibus, thorace paulo brevioribus, fortius minus dense punctatis, abdomine etiam parcius punctulato, bene distinguendus. — Long., 6 1/2-7 mill.

Algérie: Bône (*G. Olivier*); Philippeville (*Lethier ry*); Djebel Taya, dans une grotte, mars (*de Larclause*). — Tunisie: Tebour-souk, janvier; camp de la Santé, mars; Aïn-Draham, novembre; El Fedja décembre (*D^r Normand*).

3. *Atheta marcida* Er. β . *sexualis* *.

Ne diffère des *marcida* Er. d'Europe que par ses yeux à peine plus petits, ses élytres foncées comme le corselet et les caractères du σ , dont le 7^e segment dorsal est un peu plus large, légèrement impressionné en travers près de la troncature apicale et brièvement plissé de chaque côté de celle-ci, rappelant assez la forme de ce segment chez les σ du groupe d'*occulta* Er.

Tunisie: Aïn-Draham, novembre (*D^r Normand*).

Faute de pouvoir trouver aucun autre caractère distinctif entre les deux formes, je considère celle-ci comme un cas intéressant de dimorphisme sexuel.

4. *Ocyusa bimaculata* *.

Un peu plus petite que la *maura* Er., mais surtout bien plus étroite et parallèle, avec les segments 2-4 de l'abdomen bien moins impressionnés en travers à la base et une coloration générale toute différente. Brillante, convexe (moins aux élytres), à fine pubescence d'un gris fauve à l'avant-corps, assez longue, rare, à l'abdomen; d'un testacé rougeâtre avec la tête et le corselet plus foncés, un peu obscurs; articles 4 à 11 (parfois aussi l'extrémité du 3^e) des antennes noirâtres, ainsi qu'une grande tache sur chaque élytre depuis le 1/4 supérieur, n'atteignant pas le bord apical et encore moins étendue du côté de la suture; environs de l'écusson largement et suture étroitement noirâtres (de sorte que cette coloration élytrale rappelle tout à fait celle de *Bolitochara obliqua* Kr.); milieu de la base des segments 2-3 de l'abdomen, segments 4-5 (sauf la partie antérieure de la marge du 4^e), enfin les 2/3 basiliaires du 6^e égale-

ment noirâtres; base des antennes et des palpes et pattes d'un testacé plus clair; antennes robustes, renflées, à 2 premiers articles longs et robustes, 3^e presque moitié plus court que le 2^e, 4^e nettement transverse, 5-9 encore plus courts, graduellement élargis, 10^e moins court que le 9^e, 11^e obconique, plus long que 9-10 réunis; tête finement, peu densément ponctuée; yeux peu saillants; corselet cylindrique, étroit, allongé, plus large que la tête, non transverse, ovale, tous les angles très arrondis, sans sillon ni fossette, à peine plus ponctué que la tête; élytres un peu plus longues que larges, notablement plus larges que le corselet, à ponctuation bien plus visible, assez râpeuse, celle de l'abdomen moins forte, mais très nette, peu serrée, subégale à tous les segments; σ 7^e segment dorsal subtronqué, ventral obconique; φ 7^e ventral arrondi. — Long., 2 mill.

Tunisie: El Fedja; Souk el Arba, décembre (*D^r Normand*).

5. *Oxypoda punica* *.

Du groupe de l'*attenuata* Muls. Rey; très différente de celle-ci par sa taille moitié moindre, sa forme bien plus étroite, surtout à l'abdomen qui est presque parallèle, sa coloration, etc. Noire, assez brillante à l'avant-corps, brillante à l'abdomen; antennes brunes; bouche, trois premiers articles des antennes, tiers apical du 6^e segment abdominal, 7^e en entier et pattes testacés; élytres d'un testacé rougeâtre avec l'extrême base, la suture et une large tache triangulaire brunes, celle-ci allant obliquement de l'épaule jusqu'au milieu au moins du bord apical; pubescence d'un gris fauve, très fine, serrée à l'avant-corps, assez rare et longue à l'abdomen; antennes assez robustes, à 4^e article nettement transverse, les suivants graduellement élargis et transversaux, le 11^e plus court que 9-10 réunis, obconique; ponctuation très fine à la tête et au corselet, un peu plus serrée sur celui-ci, plus forte, moins serrée, un peu râpeuse aux élytres, plus rare, nette, égale, aux segments 2-5 de l'abdomen, moins forte, écartée au 6^e; corselet peu transverse, oblong, convexe, à angles postérieurs très arrondis; une fossette peu marquée au-devant de l'écusson; élytres visiblement plus longues que larges, plus larges que le corselet à leur base; σ 7^e segment obtusément tronqué en dessus et en dessous; φ 7^e ventral obconique-arrondi. — Long., 2 1/2 mill.

Tunisie: El Fedja, décembre (*D^r Normand*).

REVUE
D'ENTOMOLOGIE

PUBLIÉE PAR LA

Société Française d'Entomologie

RÉDACTEUR : ALBERT FAUVEL

TOME XVIII. — 1899.



CAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX
RUE SAINT-PIERRE, 102 & 116
—
1899

R00143 60551