

Staphylinides exotiques nouveaux

2^e Partie (1)

PAR ALBERT FAUVEL

HOLOSUS Motschulsky

H. parcestriatus *.

H. olisthæiformi Mots. proximus, sed antennis brevioribus et tenuioribus, articulo 7^o longiore quam latiore, 8-9 haud transversis, 10^o vix transverso; fronte inter antennis minime impressa; thorace brevior, fortiter transverso, longitudinaliter haud sulcato, basi intus prope angulos posticos minime impresso; abdominis striolis obliquis utrinque 5 vel 6 tantum (in *olisthæiformi* decem et ultra) impressis sat distinctis. — Long., 4 2/3 - 5 mill.

Java occid. : Pengalengan, à 1300^m d'alt. (*Fruhstorfer*).

H. pennifer *.

H. ambigeno Fvl. vicinus, sed angustior, thorace parum picescente, elytris nigro-piceis, antennis dilutioribus, rufulis, præsertim brevioribus, articulis 4-6 minoribus et brevioribus, 7-11 clavam latam formantibus, dilute rufis; capite paulo densius et subtilius punctato; thorace etiam subtilius et densius punctato, ante basin transversim multo minus impresso, impressione haud ut in *ambigeno* quasi bifoveolata; elytris haud quadratis, sed quarta parte longioribus quam latioribus, in fundo alutaceis, crebrius punctatis, punctura magis strigosula; abdomine striolis obliquis obsoletis, punctura parca sat conspicua, segmento 6^o bene punctato, fere haud striolato, distinctus. — Long. 3 1/2 mill.

Annam : Phuc-Son, novembre, décembre (*Fruhstorfer*).

(1) Voir *Rev. d'Ent.*, 1902, p. 8 à 37.

H. brevipennis *.

A præcedente thorace et elytris multo brevioribus primo visu distinctus; *H. ambigeno* Fvl. etiam vicinus, sed antennis etiam brevioribus et multo tenuioribus, articulis 4-6 angustis, fere transversis, 7-11 clavam optime distinctam formantibus, fortiter transversis; capite in fundo alutaceo, densius subtilius punctato; thorace etiam alutaceo, fortiter transverso, subtilius et densius punctato, fovea utrinque prope angulum posticum majore, impressione transversa ante basin haud bifoveolata; elytris brevibus, sat transversis, parcius et fere obsolete punctulatis; stria suturali fortius et latius impressa; abdominis segmento 6^o strigellis vere inconspicuis facillime distinguendus. — Long., 3 1/3-3 1/2 mill.

Hong-Kong; Hué; Tonkin; Inde; Sumatra.

L'exemplaire de Sumatra a été trouvé dans des tabacs de cette provenance.

H. insularis *.

H. tachyporiforme Mots. tertia parte major, multo latior, thorace hexagonali, exacte medio plus minusve vix subangulato inter omnes distinctus. Nitidus, abdomine nitidulo, niger, antennis, thorace elytrisque vix picescentibus, antennis circa apicem, ano pedibusque rufis, palpis testaceis. Antennæ pilosæ, robustæ, articulis 4-6 haud transversis, 7-10 vix latioribus, 8-10 sat transversis. Caput dense subtiliter punctatum. Thorax parum transversus, a medio ad basin sinuatim sat angustatus, antice paulo angustior, anticis posticis acutis, convexus, minus dense sat fortiter punctatus, fovea laterali utrinque minus profunda, inter foveas late transversim impressus. Elytra thorace parum latiora, fere breviora, sat dense subtiliter punctulata, extus fere lævia, margine laterali sulcato, sulco subtiliter uniseriatim punctato, stria suturali profunde et late impressa. Abdomen conicum, subtiliter oblique strigellum, segmentis apicalibus vix perspicue punctis aliquot notatis. — Long., 3 2/3-3 4/5 mill.

Variet totus rufopiceus (immaturus).

Java oriental: Monts Tengger, à 1.300^m d'alt. (*Fruhstorfer*).
Bornéo: Telang, décembre. Sumatra: Deli.

Les exemplaires de Deli a été trouvés dans des tabacs de cette

provenance. Chez l'un deus (immature), la dilatation anguleuse des côtés du corselet est à peu près nulle; mais on observe la même variation chez le *tachiniformis* Mots.

H. aberrans *.

Forma convexa et elongata minimas species generis *Holotrochi* simulans, licet minus cylindricus. Niger, nitidus, glaber, corpore antico in fundo polito, ore, antennis, segmentorum marginibus apicalibus anguste, ano pedibusque rufis. Antennæ breves, parum crassæ, capitæ thoracisque longitudine, articulo 3° 2° vix longiore, 4-7 moniliformibus, 8-10 transversis, 5 ultimis præcedentibus vix latioribus, 11° subtestaceo. Caput convexum, sat crebre subtiliter punctatum, æquale, tuberculis antennariis fere nullis, post oculos sat magnos et prominentes minime coarctatum, frontis margine apicali fortiter rotundato. Thorax capite parum latior, quadratus, convexus, fortius et parcus punctatus, a medio ad basin vix sinuatim parum angustatus, angulis posticis rectis, fovea lata, subrotundata, sat profunda utrinque basi prope angulum impressa, sulculo medio ante basin brevissimo, obsoleto. Elytra parallela, thorace parum latiora et quarta parte longiora, subtilius punctata, striolis subtilibus longitudinaliter vermiculata. Abdomen minus nitidum, vix perspicue alutaceum, subtilissime dense utrinque oblique strigellum, strigellis dorso medio longitudinaliter deletis. — Long., 3 1/2 mill.

Ceylan.

Unique.

LISPINUS Erichson

L. macropterus *.

Magnus et maxime insignis. Elongatissimus, omnino deplanatus, nitidus, niger, thorace vix, elytris magis picescentibus, antennis rufopiceis, articulo ultimo dilutiore, articulis 3 primis, ore, segmentorum marginibus vix (6° 7° que latius) pedibusque rufis. Antennæ breves, parum incrassatæ, vix capitæ thoracisque longitudine, articulo 3° 2° paulo longiore, 4-7 quadratis, 8-10 parum transversis. Caput parvum, punctis dispersis subtilibus notatum, fronte tota late et profunde utrinque impressa. Thorax sat longior quam latior, antice parallelus, a medio ad angulos posticos obtusos

sat angustatus, medio longitudinaliter sulcatus, disco utrinque prope sulcum plaga punctorum fere rugosorum notatus, sulco utrinque ante angulum posticum prælongo, lato et maxime profundo, punctis aliquot subtilissimis ante-sulcum. Scutellum fortiter 5-punctatum. Elytra longissima, thorace duplo fere longiora, in fundo alutacea, punctis dispersis subtilibus et sulculo intrahumerali antice et postice abbreviato longitudinaliter notata. Abdomen gracile, lineis parum obliquis fortiter striatum, punctis aliquot aciculatis intermixtis. — Long., 5 1/2 mill.

Celebes sud : Bua-Kraeng, à 4.700^m d'alt., février (*Fruhstorfer*).

Unique.

L. validicornis *.

L. lineipenni Fvl. proximus, sed duplo major et latior, nitidior, nigerrimus, antennis piceis, ore, segmentorum marginibus, ano pedibusque rufis; antennis duplo crassioribus, multo longioribus, articulis 4-7 et præsertim 8-10 transversis; capite convexiore, vix alutaceo, crebrius punctato, fronte antice profundius biimpressa, oculis depressis; thorace a medio ad angulos posticos rectos, nec obtusos, magis sinuatim angustato, dorso fortius punctato; elytris magis nitidis, convexioribus, minus alutaceis, sulco disci latiore, profundiore et usque ad fossam humeralem antice producto, cæterum densius punctatis; abdomine crasso, multo densius et fortius striolato, etiam crebrius punctato bene distinctus. — Long., 5 mill.

Queensland : Cooktown, août (*Meek*).

Deux exemplaires.

L. sulcatus *.

L. lineipenni Fvl. iterum proximus, sed paulo major, latior, nitidior; intensius niger; antennis crassioribus et longioribus; capite thoraceque convexioribus, parcus et fortius punctatis, hoc latiore, fossa ante angulos posticos rectos abbreviata, medium haud superante, cæterum multo latiore; elytris fortius punctatis, sulco latiore et profundiore, antice usque in fossa humerale prolongato; abdomine paulo fortius strigello distinguendus. — Long., 3 1/2 mill.

Nouvelle-Guinée : baie Huon; Sattelberg; Friedrich-Wilhelmhafer; ile Deslacs (*Biro*).

L. rugipennis *.

Magnus, robustus, nitidissimus, minime alutaceus, niger, antennis squalide rufescentibus, ore, segmentorum marginibus anguste, ano pedibusque rufis. Antennæ elongatæ, crassæ, articulis 3-11 longioribus quam latioribus. Caput convexum, parce fortiter punctatum, post oculos mediocres parallelum, fronte antice truncata. Thorax quadratus, antice vix angustatus, postice sinuatus, angulis posticis parum obtusis, fovea prope angulum lata, profunda, medium vix attingente, capite fortius et densius punctatus, sulco medio longitudinali subtilissime impresso. Scutellum parce sicut caput punctatum. Elytra prælonga, thorace tertia parte longiora, deplanata, thorace subtilius sed densius subrugose punctata, punctis aliquot majoribus subseriatis. Abdomen dense fortiter punctatum, lateribus punctis grossis aciculatis notatis. — Long., 7 1/2 mill.

Java : Teibodas, octobre.

L. acicularis *.

Præcedenti vicinus, sat dimidio minor, angustior, antennis multo tenuioribus; capite angustiore, oculis magis prominentibus; thorace brevior, sat transverso, connexiore, antice rotundatim magis angustato, postice vix ante angulos rectiores sinuato, sulco medio nullo, punctura subtiliore; scutello crebrius punctato; elytris thorace tertia parte fere longioribus, convexis, paulo minus subrugose punctatis; abdomine dense fortiter punctato, lateribus punctis grossis aciculatis destitutis. — Long., 5 mill.

Java.

Unique.

L. quadrinotatus *.

L. quadrillum Fvl. vicinus, sed multo angustior, gracillimus, deplanatus, minus alutaceus, antennis pedibusque dilutioribus; antennis brevioribus et tenuioribus; fronte longius biimpressa; thorace postice magis angustato et profundius sinuato, fovea angulum posticum attingente, minus profunda, punctura versus latera magis perspicua; scutello magis perspicue punctato; elytris planis,

longioribus; abdomine utrinque subtilius, densius et longius strigello optime distinguendus. — Long., 5 1/2 mill.

Perak; Java; Celebes sud: Bua-Kraeng, 1700^m d'alt., février (*Fruhstorfer*).

Chez l'exemplaire de Java, le sillon médian du corselet est effacé.

L. binotatus *.

L. quadrinotato Fvl. dimidio fere minor, similiter angustatus et coloratus, sed capite minore, fronte anguste bifossulata, utraque fovea quasi subtiliter bipunctata, oculis minoribus, minus prominentibus; thorace quadrato, postice multo minus angustato licet magis sinuato, multo subtilius punctato, fovea ante angulos posticos longiore, sulco longitudinali nullo; elytris minus elongatis, thorace quarta parte longioribus, minus deplanatis, vix perspicue punctulatis, utroque puncto majore unico paulo antérieus post fossam humeralem sito; abdominis disco medio strigellis latius destituto optime distinguendus. — Long., 4 mill.

Nouvelle-Guinée: baie de l'Astrolabe: Stephansort; île Deslaes (*Biro*).

Les *quadrillum* et *quadrinotatus* ont sur chaque élytre deux points assez gros en plus de la très fine ponctuation foncière, l'un avant la base, l'autre avant l'extrémité. Chez *binotatus* il n'existe que le point basilaire; l'antéapical fait défaut.

ELEUSIS Laporte.

E. rufiventris *.

♂. Inter majores. Colore *E. punctigera* Fvl., sed abdomine rufo, segmento basilari parum piceo excepto, cæterum multo minus nitida, parce obsoletissime punctata, in fundo alutacea. Antennæ breviores et minus graciles. Caput postice minus dilatatum, basi multo minus constrictum, sulcis juxta oculos duplo majores multo profundioribus et longioribus, fronte triangulariter obsolete impressa, antice longius producta, foveola plus minusve profunda prope tubercula antennaria, sulco longitudinali a fovea basali usque ad medium extenso. Thorax multo brevior, duplo et ultra

latis quam longior, utrinque fortiter dentatus, sulculo medio omnium subtilissimo, vix perspicuo, utrinque abbreviato. Elytra dorso plana, post humeros longitudinaliter elevata, apice aliquando viridisericella. Abdomen basi aliquando etiam sericeum. ♀. Minor, angustior, capite breviter orbiculato; thorace longiore et angustiore; elytris vix longioribus a ♂ distinguenda. — Long., 6-9 1/2 mill.

Sumatra : Monts Singalang, juillet (*Beccari*).

E. conifrons *.

♂. Ab *E. ruficentre* Fvl. colore corporis antici nigro-subæneo, fronte antice fortiter conica, apice tantum truncata, et præsertim oculis triplo minoribus primo visu distincta; ab *E. puntigera* Fvl. colore corporis antici alutacei, abdomine obscure rufo, fere toto infuscato, segmento 7°. rufotestaceo; antennis paulo longioribus, articulo 5°. præsertim longiore; capite longiore et angustiore, post oculos minores multo minus inflato, sulco juxtaoculari profundiore et longiore, fronte fortiter conica, magis perspicue punctata, vertice sat dense punctato, sulco longitudinali a vertice ad medium producto, fronte ante sulcum late subtriangulariter impressa; thorace circa basin minus angustato, dente laterali utrinque multo fortiore, disco latissime et profunde biimpresso, carinula media longitudinali acutiusecula; elytris paulo longioribus, lateribus haud rotundatis, puncto discoïdali minore facillime cognoscenda; ♀ latet. — Long., 6 mill.

Sumatra : Monts Singalang, juillet (*Beccari*).

Je ne possède qu'un ♂ de cette espèce, confondu dans une brochette avec l'*E. ruficentris* et provenant de la collection W. Rothschild.

E. Warburgi *.

♂ *E. vermiculari* Fvl. vicina, similiter colorata, sed multo minor, antennis multo brevioribus, articulis 6-10 fortiter transversis, minime turbinatis; capite brevior, minus plano, subtilius punctato, oculis paulo majoribus, sulco juxtaoculari multo brevior, postice abbreviato, vertice unifoveolato, ante foveam vix perspicue sulcato, frontis margine antico rufulo, apice parum emarginato, nec truncato; thorace brevior, subsemicirculari, utrinque bene

denticulato, medio haud sulcato; elytris brevioribus, fere quadratis optime distincta; ♀ latet. — Long., 5 1/2 mill.

Celebes : Minahassa (*D^r Warburg*).

E. discalis *.

♂. Nigra, nitidissima, in fundo lævis, ore, antennis, ano pedibusque rufopiceolis, elytris macula magna flava usque ad basin extensa ibique infuscata pictis. Antennæ sat breves, articulis 5-10 moniliformibus. Caput magnum, paulo longius quam latius, exacte parallelum, oculis mediocribus, planis, sulco juxtaoculari longo, tenui, subtiliter sat dense, antice paulo fortius punctatum, disco post medium obsolete breviter sulcatulum, frontis margine antico sat rotundato, medio emarginato. Thorax capite vix latis, subsemicirculari, punctis dispersis vix perspicuis, sulco medio longitudinali abbreviato, omnium subtilissimo, lateribus dente destitutis. Elytra quarta parte longiora quam latiora, parce subtilissime punctata. Abdomen præter puncta ordinaria setigera læve. ♀ latet. — Long., 6 1/2 mill.

Sumatra : Monts Singalang, juillet (*Beccari*).

E. plagiata *.

♂. *E. discali* Fvl. latis, similiter colorata, licet elytrorum macula flava magis limitata, sutura et spatio circa scutellum latis et intense nigris; capite brevior et latior, subquadrato, densius punctato, post oculos minus depressos parum ampliato, sulco juxtaoculari multo profundiore et latior, sulco longitudinali lato, sat profundo, frontis margine antico obtuse magis producto; thorace paulo brevior, basi vix angustior, sulco medio profundiore; elytris vix brevioribus, fortius punctatis, bene distincta. ♀ latet. — Long., 6-7 mill.

Sikkim : Darjeeling.

E. rotundiceps *.

♂. Colore *E. plagiata* Fvl., sed triplo minor et dimidio angustior, antennis tenuibus, capite thoraceque paulo brevioribus, rufis,

artículo 1° præter apicem piceo, 7-10 sat transversis; capite orbiculato, subtiliter sat dense punctulato, sulco juxtaoculari lato et profundo, oculis, mediocribus, frontis margine antico minus producto, late truncato; thorace parvo, capite angustiore, vix latiore quam longiore, triangulari, disco haud sulcato, utrinque oblique late impresso, capite subtilius punctato, lateribus mediocriter denticulatis; elytris disperse subtiliter punctatis; abdomine sat alutaceo facillime distinguenda. ♀ latet. — Long., 4 1/3 mill.

Sikkim: Darjeeling.

Unique.

E. quadridens *.

♂ Thoracis lateribus utrinque quadridenticulatis, dente antico minore, ante medium sito, inter omnes primo visu distincta. Angusta, nigro-picea, capite nigro, femoribus piceis, ore, antennis, frontis margine antico, thoracis basi et apice, plaga humerali diffusa et obscura, segmentorum marginibus, tibiis tarsisque squalide rufis. Corpus anticum subtilissime strigellum, minus nitidum, abdomine transversim alutaceo. Caput elongatum, sat longius quam latius, parallelum, planissimum, disperse subtilissime punctatum, oculis mediocribus, planissimis, sulco juxtaoculari subtili, frontis margine antico parum producto, sat late truncato. Thorax vix capitis latitudine, paulo latior quam longior, antice parallelus, a medio ad basin fortiter angustatus, sicut caput punctatus, spatio longitudinali tenuissimo lævi. Elytra thorace latiora, tertia parte longiora, fortius punctulata. ♀ latet. — Long., 4 1/2 mill.

Perak.

Unique.

E. lunigera *.

E. Krautzi Fvl. (*apicipennis* Kr.) proxima, sed capite, thorace, elytrorum tertia fere parte apicali abdominisque segmento 6° præter apicem piceis vel rufo piceis; antennis elongatis, articulis omnibus longioribus, penultimis haud transversis; capite in ♂ minus dilatato, sulco juxtaoculari latiore et longiore; elytris paulo longioribus, densius at subtilius punctatis unice distincta. — Long., 3-4 mill.

Huê; Malacca; Singapore; Java: Teibodas, 10 (*Beccari*); Pengalengan, vers 1.300^m d'alt. (*Fruhstorfer*); Sukabumi, 7 (*Rouyer*). — Nouvelle-Guinée: Friedrich-Wilhelmshafen; baie Huon: Simbang; Sattelberg; ile Deslaes (*Biro*).

APATETICA Westwood

A. semiviolacea *.

Brevis, lata, nitidissima, picea, capite præter frontem anticam nigricante, antennarum articulis 5 primis, thoracis lateribus femoribusque præter apicem squalide rufis vel rufotestaceis, elytris splendide violaceis. *A. brunneipes* Ritz. vicina, sed colore, antennis minus elongatis, articulis omnibus, præsertim 7-10, brevioribus; capite disco paulo densius punctato, oculis vix minoribus; thorace angustiore, utrinque angustius explanato, explanatione versus latera haud incrassata, antice fortiter angustata, angulis anticis truncatis, haud productis, lateribus ante angulos posticos brevius rotundatis; elytris multo brevioribus, profundius striatis, striis fortius punctatis, angulo apicali externo obtuso, haud spinoso, maxime distincta. — Long., 7 mill.

Java: Mont Ardjuno, à 1.000^m d'alt., janvier (*Doherty*).

Unique.

A. rotundicollis *.

Thorace latissimo, antice maxime attenuato, angulis anticis rotundatis ab omnibus distincta. Nigerrima, nitidissima, palpis, antennarum articulis 5 primis tarsisque squalide rufis. Antennæ elongatæ, articulis 2-5 præsertim gracilibus et longis. Caput crebre subtiliter punctatum, disco biplagiati lævi. Thorax brevissimus, post medium duplo latior quam longior, inde ad angulos posticos maxime rotundatus, lateribus postice latissime explanatis, haud marginatis, anterieus marginatis sed anguste explanatis, sat fortiter et sat dense punctatis, punctis disco subtilioribus, biplagiati notatis, foveola rotunda post medium sita. Scutellum magnum, basi duplo fere latius quam longius. Elytra parum transversa, thoracis latitudine, profunde striata, striis fortiter punctatis, angulo apicali

externo rotundato. Abdomen sat subtiliter, utrinque densius, punctatum. Pedes robustiores. — Long., 8 1/2 mill.

Khasia Hills.

Unique.

A. sparsicollis *.

A. javanicæ Sharp vicina, multo nitidior, nigerrima, palpis, antennarum articulis 5 primis femoribusque squalide rufis, tarsis rufis; antennis multo brevioribus, basi tenuioribus, articulo 1° clavato, 2° brevissimo, 3° 4° plus quam tertia parte longiore, 7 et 9 quadratis, 8 et 10 parum transversis. Caput disco paulo minus punctato. Thorax minor, multo brevior, ab angulis anticis multo minus proeminentibus usque ultra medium subrotundatus, lateribus antice latius explanatis, angulis posticis haud acutis, fere triplo parcius punctatis, disco medio utrinque foveatim biimpresso. Scutellum angustius. Elytra striis paulo fortius punctatis, interstriis minus alte elevatis, angulo apicali externo rotundato. Abdominis punctura omnino alia, segmenti 5ⁱ. parca, subtilissima, 6ⁱ. parum densa, quam in *javanico* subtiliore. — Long., 6 1/2 mill.

Lombok : Sapit, vers 700^m d'alt., avril (*Fruhstorfer*).

Unique.

A. lævicollis *.

Minus convexus, nitidissimus, ferrugineus, palpis, antennis et capite nigris, thoracis lateribus tarsisque squalide rufo-testaceis. Antennæ sat elongatæ, articulis omnibus longioribus quam latioribus, 2 et 4 basi rufis, 3° dimidia parte basali etiam rufo. Caput subtiliter punctulatum, disco præter plagam mediam lævi. Thorax basi duplo latior quam longior, a basi ad angulos anticos obtusissimos regulariter arcuatus, licet dimidio postico fere parallelo, angulis posticis acutis, ante hos angulos sat late explanatus ibique quasi striola obliqua notatus, explanatione anterie angustata. lateribus crasse fere usque ad basin marginatis, parum dense vix perspicue punctulatus, punctis aliquot majoribus ad latera notatis. Scutellum sat angustum. Elytra thorace tertia parte longiora, striis angustis, parum profundis, sat subtiliter punctatis, basi summa abbreviatis, apice cum angulo externo fortiter rotundatis.

Abdominis segmento 6° dense sat fortiter punctulato. — Long., 6 1/2 mill.

Tonkin central : Chiem-Hoa, août à septembre (*Fruhstorfer*).

Le seul exemplaire que je possède est sans doute immature, et la coloration du corselet et des élytres notamment doit être plus foncée, peut-être noire chez les individus bien développés.

TRIBU PROTININI

MEGARTHURUS Stephens.

M. bimaculatus *.

In genere insignis. Breviter ovatus, convexus, squalide testaceus, thoracis disco parum infuscato, palpis, antennarum articulis 7-10 abdominisque segmentis 3-5 nigro-piceis, elytrorum macula magna anteapicali antice oblique truncata, nec suturam, nec apicem, nec latera attingente, nigra. Antennæ tenues, articulis 3-5 elongatis, æqualibus, 7-11 clavam formantibus, 11° piceorufo. Caput opacum, rugose punctulatum, fronte media vix elevata, subtilissime marginata, margine apicali late truncato. Thorax minus opacus, parvus, angustus, duplo latior quam longior, lateribus nitidis, fortiter rotundatis, parum explanatis, vix sinuatis, ante angulos posticos vix perspicue emarginatis, fossa obsoleta utrinque ante medium, disco haud sulcato, sed obsolete a medio ad basin carinulato, fortiter rugose punctatus. Elytra convexa, basi thoracis latitudine, hoc tertia parte longiora, a basi ad apicem fortiter ampliata, sat nitida, punctis grossis æqualiter sat dense notata. Abdomen fere opacum, subtilissime dense asperulo-punctatum, punctis breviter squamulosis. — Long., 2 1/3 mill.

Ceylan.

Unique.

Très distinct de toutes les espèces du genre par sa couleur, sa ponctuation et son corselet dépourvu d'échancrures latérales.

M. basicornis *.

M. affini Miller parum vicinus; antennarum colore, thorace um-

bonato, fortiter 4-impresso, lateribus triemarginatis, humeris elevato-productis ab omnibus primo visu distinctus. Niger, capite thoraceque opacis, elytris sat nitidis, abdomine vix nitidulo; antennis fuscis, articulis 4 primis, palpis, thoracis lateribus, abdominis segmentis 6 et 7 apice pedibusque rufo-testaceis. Antennae tenuissimae, breviores, articulo 11° rufo-fusco. Caput ut in *affine*, fronte vix parcius punctata. Thorax adhuc brevior, duplo latior quam longior, crebrius rugosus, lateribus fortiter rotundatis, antice et postice aequaliter explanatis, triangulatis, angulo 1° parum post angulum anticum sito, 2° prope medium, 3° inter angulum 2^{um} et angulum posticum acutum sito, disco umbonato, profunde longitudinaliter sulcato, utrinque fossa profunda antica, intus obliqua, fossa alia basali arcuata. Elytra quam in *affine* paulo magis asperula, callo humerali recte elevato, in carinam postice oblique longe producto, lateribus post callum breviter profunde sinuatis, impressione obliqua ab angulo apicali externo obtuso discum versus producta. Abdomen paulo subtilius et densius asperulum et squamulosum. — Long., 2 1/2 mill.

Sikkim : Darjeeling (*Christie*).

Unique.

HOMALIINI

ANTHOBIUM Stephens.

A. Sikkimi *

Angustatum, nitidum, testaceum, elytris pallidis. *A. Marshami* Fvl. sat vicinum, sed antennis basi tenuioribus, articulis 4-6 paulo longioribus; capite thoraceque minoribus, nitidioribus, densius aequaliter punctatis, magis convexis; oculis minoribus; thorace brevior et angustior, transversim exacte ovali, angulis omnibus rotundatis, foveola unica ante scutellum sita, vix perspicua; elytris disco deplanatis, vix rugosius et subtilius punctulatis, apice recte truncatis; abdomine parcius punctulato facillime distinguendum. — Long., 2 mill.

Sikkim : Darjeeling (*Christie*).

Unique.

HOMALIUM Gravenhorst

H. sulcicolle *

H. pusillo Grav. duplo majus et latius, similiter coloratum, sed thorace minus opaco, antennis tenuioribus, articulis 6-11 piceis; capite planiore; thorace brevior et multo latiore, duplo latiore quam longiore, basin versus magis angustato, medio longitudinaliter sulcato, fossis duabus minus profundis, lateribus latius explanatis, disco parce sed perspicue punctato; elytris amplis, brevioribus, quadratis, sat crebre subtiliter punctatis optime distinctum. — Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Sumatra : Palembang.

H. chlorizans *

Præcedenti vicinum, sed dimidio minus et angustius, thorace extra fossas, elytris abdomineque sat nitidis. Piceum, antennarum basi pedibusque testaceis; elytris squalide flavis, viridi-tinctis. Antennae breves, articulis 4-10 transversis, 5-11 gradatim clavatis. Caput parce vix perspicue punctulatum, utrinque impressum; oculis magnis. Thorax tertia parte latior quam longior, fossis duabus disci maxime profundis, utrinque ad latus et basi late explanatus, lateribus medio vix angulatis, inde ad angulos posticos acutos oblique angustatus, disco inter fossas laevi, caeterum punctis raris subtilibus notatus. Elytra quadrata, dense subtiliter punctata. Abdomen subtilissime punctulatum. — Long., 1 1/2 mill.

Sumatra : Ajer Manteior, août (*Beccari*).

H. obesum *

In sectione *Hapalaræa* collocandum. *H. pygmaeo* Payk. triplo minus, necnon brevius et latius, caeterum omnino diversum. Sat convexum, rufum, parum nitidulum, capite thoraceque fere opacis, palpis, pedibus antennarumque articulis 5 primis testaceis, 6-11 piceolis, clavam formantibus; abdomine vix infuscato. Antennae breves, thoracem medium attingentes, articulo 5° quadrato, 6-10

fortiter transversis. Caput planum, sat dense subtiliter punctulatum, fronte utrinque vix impressa, oculis magnis. Thorax tertia parte latior quam longior, convexus, æqualis, capite crebrius subtiliter punctatus, lateribus ultra medium vix angulatis, antice et postice fortiter angustatis, angulis anticis omnino rotundatis, posticis parum obtusis, basi utrinque prope angulos late sed obsolete oblique impressa. Elytra thorace paulo latiora, paulo longiora quam latiora, fortius sed fere dimidio parcius punctata. Abdomen parce obsolete punctulatum. — Long., 2 mill.

Sumatra : région de Deli, dans des tabacs importés.

H. rude *

Præcedenti vicinum, minus et angustius, similiter coloratum, sed antennis totis rufis, articulis 8-11 tantum clavam latiore formantibus. Caput multo minus, rugose punctulatum, fronte antica læviuscula, oculis multo minoribus Thorax angustus, minus transversus, lateribus fortiter rotundatis, sat dense vix rugosule punctulatus. Elytra angusta, thorace tertia parte longiora, densissime subtilissime longitudinaliter rugella, punctis intermixtis vix perspicuis. Abdomen parce obsolete punctulatum. — Long., 1 3/4 mill.

Sumatra : région de Deli, dans des tabacs importés.

Unique.

TETRADELUS *

Genus sectionem peculiarem (*TETRADELI*) tarsorum structura inter *Homaliinos* formans. Corpus latum, oblongum, depressum, alatum. Caput post oculos denticulatum, basi fortiter constrictum. Ocelli minuti, distantes. Oculi parum prominentes. Labrum transversum, arcuatum, haud emarginatum. Pedes robusti; tarsi 4-articulati, articulis 3 primis brevibus, 1° 2° breviora, 4° tribus præcedentibus simul sumptis longiore, unguiculis validis, longe arcuatis, basi denticulatis. Cætera ut in *Homalio*.

A cause de la présence de deux ocelles, ce genre ne peut être placé que dans la tribu des *Homaliini*; mais il y est très aberrant par ses tarsi de 4 articles (au lieu de 5) et ses ongles dentés à la base. Nous l'inscrivons donc dans une section particulière (*TETRA-*

DELI), caractérisée par cette remarquable structure des tarsi et nous le plaçons à la fin de la tribu des *Homaliini*.

La seule espèce qu'il renferme a la taille et la forme déprimée d'un *Trigonurus*, quoique très différente d'ailleurs.

T. trigonuroïdes *

Nigerrimus, nitidulus, palpis, antennarum articulis 4 primis pedibusque rufis; genibus et tibiis apice parum infuscatis. Antennæ capituli thoracisque longitudine, basi graciles, fortiter ab articulo 8° clavatae, 3° 2° tertia parte longiore, 4° quadrato, 5-7 paulo longioribus quam latioribus, 8°, conico, 9-10 dilatatis, 9° parum, 10° magis transversis, 11° pyriformi, duobus præcedentibus simul sumptis paulo breviora. Caput transversum, creberrime subtilissime punctulatum, late et profunde sinuatim utrinque depressum, fronte media antice umbonata, sublævi, nitida, margine antico obtuse producto, tuberculis antennariis diminutis; oculis sat magnis, vix prominentibus. Thorax magnus, capite duplo fere latior, tertia parte latior quam longior, antice fortiter rotundatus, a medio ad basin vix angustatus, angulis anticis rotundis, posticis rectis, vix perspicue marginatus, fere planus, parum inæqualis, impressione arcuata antice post caput, lateribus a medio ad basin triangulariter parum explanatis, cæterum creberrime subtiliter punctulatus. Scutellum triangulare, similiter punctulatum. Elytra quadrata, plana, creberrime subtiliter vix rugosule punctulata, ab humero ad apicem obtuse elevata, costula disco sat perspicua, postice abbreviata, costa alia breviora inter hanc et suturam, stria suturali nulla, margine apicali recte truncato. Abdomen latum, subdepressum, conicum, opaculum, sat dense fusco pubescens, adhuc densius subtiliusque punctulatum. — Long., 5 mill.

Sikkim : Darjeeling (*Christie*).

TRIBU OXYTELENI

PLANEUSTOMUS Duval.

P. indicus *

Pl. miles Scriba proximus, totus testaceus, nitidus; antennis

brevioribus, articulis 4-5 satis, 6° fortiter transversis, 7-11 clavam formantibus, 7, 9, 10 haud, 8° fortiter etiam transversis; capite magis rotundato, dimidio parcius et subtilius seriatim punctato, oculis tertia parte minoribus; thorace paulo brevior, subtilius paulo parcius punctato, disco haud sulcato; elytris subtilius punctatis; abdomine utrinque punctis subtilissimis aliquot tantum notato. — Long., 4-5 mill.

Birmanie.

Un exemplaire du Musée de Prag (coll. Helfer) a 5 mill. de longueur.

CRYMUS *

Genus *Planeustomo* Duv. vicinum. Corpus elongatum, parum convexum, apterum, antice parce, abdomine densius, aureo-setosum. Caput parvum, obconicum, oculis minimis, prope basin sitis. Labrum productum, arcuatim emarginatum. Palpi maxillares breves, 3° 2° tertia parte brevior. Mandibulæ sub labro occultæ, minime proeminentes. Mentum magnum, trapeziforme, apice recte truncatum. Ligula late parum emarginata. Palpi labiales articulis 2 primis brevibus, æqualibus, ultimo tertia parte longiore. Antennæ clavatæ, articulo primo brevi. Prosternum ante coxas anticas contiguas vix acutum. Mesosternum subcarinatum, coxis intermedis contiguis, sat obliquis. Metasternum brevissimum, postice fere recte truncatum, foveola magna, profunda notatum. Pedes longiores, sat graciles, femoribus minime inflatis, tibiis gracilibus, simplicibus, nec arcuatis, nec dilatatis, nec longe spinosis ut in *Planeustomo*, sed anterioribus tantum dentibus minimis aliquot vix perspicuis armatis; tarsis brevibus, magis robustis, quadriarticulatis, articulis 3 primis, præsertim anticorum, latis, brevissimis, 4° his simul sumptis tertia parte longiore, unguibus validis, simplicibus.

Sexus differentia latet.

Ce genre tétramère est très distinct des *Planeustomus* notamment par sa forme générale atténuée en avant, celle des palpes et surtout ses pattes grêles, inermes, avec les premiers articles des tarsi très courts (1).

(1) J'ai dit dans ma *Faune gallo-rhénane* (III, 428) que les tarsi des *Planeustomus* étaient tétramères chez *cephalotes*, *Kabri* et *palpatis*. Aujourd'hui je les retrouve tels chez *africanus*, la plus grande espèce du genre, ce qui me dis-

C. antarcticus *.

Totus dilute ferrugineus, nitidulus, in fundo alutaceus. Antennæ sat robustæ, circa apicem parum incrassatæ, articulo 3° 2° vix longiore, 8-10 vix transversis, 11° parvo, breviter ovato. Caput fronte declivi, antice rotundata, utrinque parum impressa, postice 4-foveolata, callis antennariis obsolete, vertice a collo sulco arcuato separato, medio ante sulcum bifossato, genis post oculos brevibus, rotundatis. Thorax capite tertia fere parte latior, parum transversus, postice sat fortiter angustatus et parum sinuatus, angulis obtusis, punctis aliquot fortiter notatis, dorso subsinuatum late et profunde bisulcatus, sulcis postice abbreviatis, intervallo obtuse carinulato, versus latera parum inæqualis. Scutellum magnum, impunctatum. Elytra basi thoracis latitudine, hoc quarta parte longiora, a basi ad apicem fortiter ampliata, apice separatim fortiter rotundata, dorso deplanata, parum inæqualia, punctis raris obsolete notata, punctis aliquot magnis subfoveolatis intermixtis. Abdomen segmentis 2-5 utrinque fortiter sat dense, 6-7 subtilius, punctatis, linea media longitudinali angusta impunctata; 7° ventrali late parum subtriangulariter impresso, apice truncato. — Long., 5 1/3 mill.

Nouvelle-Géorgie du Sud (*D' con d. Steinen*).

D'après son faciès, ce curieux Staphylin doit être maritime, d'autant plus que la petite île d'où il provient est presque en entier couverte de glaciers et de neiges perpétuelles.

COPROPHILUS Latreille

C. alticola *.

C. striatulo Fabr. plerumque major, longior, multo nitidior, vix

pense de les vérifier chez les autres. Mais cette opinion, je l'avoue, est contraire à celles des auteurs. Kraatz les déclare pentamères, tandis que Jacquelin du Val, C. G. Thomson, Rey et Ganglbauer les ont vus trimères seulement; ce dernier auteur indique même (*Kœferf.*, II, 671) la raison de ma méprise; j'ai pris le premier article pour deux, trompé par un léger étranglement qu'on remarque avant sa base.

Malgré tout mon respect pour mes cinq savants contradicteurs — et si diabolique que ce soit d'après le proverbe, — je persévère dans mon opinion.

æneo tinctus, antennis nigrifutis, articulo 2° longiore; capite convexiore, fronte multo minus impressa; thorace toto alio, oblongo, convexo, subtilius punctato, postice minus sinuato, angulis posticis parum obtusis, lateribus parum inæqualibus, antice vix marginatis, disco haud sculpturato, foveis duabus tantum mediocribus medio longe ante basin impresso; elytris brevius, confusus striatis, striis parcius et fortius punctatis, tertia parte apicali polita, punctis paucis notata; abdomine punctis aliquot subtilibus, segmento 6°. basi parum crebre punctulato amplissime distinctus. — Long., 6-7 1/2 mill.

Himalaya : Simla, juillet.

TROGOPHLEUS Mannerheim

T. fuscipalpis *

Inter species sectionis *Carpatini* collocandus, sed ab omnibus omnino diversus. Parum nitidus, abdomine solo nitidissimo, sat dense longe fusco-pubescent, capite thoraceque perangustis, elytris amplissimis insignis. Niger, palpis, antennis elytrisque fuscis, antennarum articulis 2 primis pedibusque cum coxis testaceis. Antennæ capite thoraceque paulo longiores, versus apicem sat incrassatæ, longe pilosæ, articulis penultimis subquadratis. Caput convexum, dense fortiter punctatum, oculis prominentibus, genis post oculos brevibus. Thorax capite paulo latior, paulo latior quam longior, convexus, cordatus, angulis anticis omnino rotundatis, impressione arcuata ante basin transversim profunda, dense fortiter punctatus, spatio longitudinali ante impressionem perangusto, subcarinato, lævi. Scutellum utrinque bipunctatum. Elytra thorace plus quam duplo latiora, duplo longiora, ut thorax punctata. Abdomen subtilissime parce punctulatum, segmentis 2-4 basi late et profunde transversim impressis. — Long., 3 mill.

Ceylan : Nuwara Elia (*Eug. Simon*).

P. lepidicornis *

Forma *T. corticini* Grav., capite thoraceque opacis, creberrime subtiliter rugose punctatis, antennarumque colore primo visu

cognoscendus. Niger, elytris piceis, pedibus testaceis. Antennæ tenues, capitis thoracisque longitudine, aurantiacæ, articulis 2-6 piceolis, haud transversis, 7-8 satis, 9-10 minus transversis, his duabus latioribus. Caput transversum, fronte utrinque parum impressa, ante antennas fere impunctata, oculis mediocribus, genis post oculos sat longe rotundatis. Thorax hexagonalis, sat transversus, ante medium subangulatim dilatatus, angulis obtusis, foveola vix perspicua medio ante apicem. Elytra thorace tertia parte latiora, parum transversa, nitidula, creberrime subtiliter punctato-rugosula. Abdomen nitidius, impunctatum. — Long., 2 1/2 mill.

Celebes : Macassar, janvier.

XEROPHYGUS Kraatz.

X. ocellaris *

X. pallipes Mots. paulo major et latior, brevius pubescens, obscure rufus, capite nigro, thorace piceo, ore, antennis, ano pedibusque testaceis, elytris versus angulum externum apicalem abdominisque segmentis basi infuscatis. Caput brevius et latius, fronte antica haud (ut in *pallipes*) fossata; oculis multo majoribus, temporibus post hos nullis. Thorax antice magis dilatatus, postice magis angustatus, duplo crebrius et subtilius asperulo-punctulatus, impressionibus duabus disci latioribus, alia utrinque oblique antierius ad latus extensa. Elytra quadrata, adhuc subtilius et crebrius asperulo-punctulata. Abdomen minus nitidum, crebrius punctulatum, segmentis 2-4 basi obsolete transversim impressis. — Long., 4 mill.

Sumatra : Palembang ; Deli.

DELOPSIS Fauvel.

D. microphthalma *

D. cornutæ Fvl. sat vicina, similiter colorata et punctata, sed dimidio fere minor, antennis a basi ad medium multo gracilioribus, articulis primis dilutioribus, 1 et 2 rufis; oculis triplo fere minoribus; thorace basi utrinque prope sulcum haud fossato, angulis anticis magis productis; elytris brevioribus, fortiter trans-

eneo tinctus, antennis nigris, articulo 2^o longiore; capite convexiore, fronte multo minus impressa; thorace toto alio, oblongo, convexo, subtilius punctato, postice minus sinuato, angulis posticis parum obtusis, lateribus parum inaequalibus, antice vix marginatis, disco haud sculpturato, foveis duabus tantum mediocribus medio longe ante basin impresso; elytris brevius, confusius striatis, striis parcius et fortius punctatis, tertia parte apicali polita, punctis paucis notata; abdomine punctis aliquot subtilibus, segmento 6^o. basi parum crebre punctulato amplissime distinctus. — Long., 6-7 1/2 mill.

Himalaya: Simla, juillet.

TROGOPHLEUS Mannerheim

T. fuscipalpis *.

Inter species sectionis *Carpalimi* collocandus, sed ab omnibus omnino diversus. Parum nitidus, abdomine solo nitidissimo, sat dense longe fusco-pubescentis, capite thoraceque perangustis, elytris amplissimis insignis. Niger, palpis, antennis elytrisque fuscis, antennarum articulis 2 primis pedibusque cum coxis testaceis. Antennae capite thoraceque paulo longiores, versus apicem sat incrassatae, longe pilosae, articulis penultimis subquadratis. Caput convexum, dense fortiter punctatum, oculis prominentibus, genis post oculos brevibus. Thorax capite paulo latior, paulo latior quam longior, convexus, cordatus, angulis anticis omnino rotundatis, impressione arcuata ante basin transversim profunda, dense fortiter punctatus, spatio longitudinali ante impressionem perangusto, subcarinato, laevi. Scutellum utrinque bipunctatum. Elytra thorace plus quam duplo latiora, duplo longiora, ut thorax punctata. Abdomen subtilissime parce punctulatum, segmentis 2-4 basi late et profunde transversim impressis. — Long., 3 mill.

Ceylan: Nuwara Elia (*Eug. Simon*).

P. lepidicornis *.

Forma *T. corticini* Grav., capite thoraceque opacis, creberrime subtiliter rugose punctatis, antennarumque colore primo visu

cognoscendus. Niger, elytris piceis, pedibus testaceis. Antennae tenues, capitis thoracisque longitudine, aurantiacae, articulis 2-6 piceolis, haud transversis, 7-8 satis, 9-10 minus transversis, his duabus latioribus. Caput transversum, fronte utrinque parum impressa, ante antennis fere impunctata, oculis mediocribus, genis post oculos sat longe rotundatis. Thorax hexagonalis, sat transversus, ante medium subangulatim dilatatus, angulis obtusis, foveola vix perspicua medio ante apicem. Elytra thorace tertia parte latiora, parum transversa, nitidula, creberrime subtiliter punctato-rugosula. Abdomen nitidius, impunctatum. — Long., 2 1/2 mill.

Celebes: Macassar, janvier.

XEROPHYGUS Kraatz.

X. ocularis *.

X. pallipes Mots. paulo major et latior, brevius pubescens, obscure rufus, capite nigro, thorace piceo, ore, antennis, ano pedibusque testaceis, elytris versus angulum externum apicalem abdominisque segmentis basi infuscatis. Caput brevius et latius, fronte antica haud (ut in *pallipes*) fossata; oculis multo majoribus, temporibus post hos nullis. Thorax antice magis dilatatus, postice magis angustatus, duplo crebrius et subtilius asperulo-punctulatus, impressionibus duabus disci latioribus, alia utrinque oblique anterius ad latus extensa. Elytra quadrata, adhuc subtilius et crebrius asperulo-punctulata. Abdomen minus nitidum, crebrius punctulatum, segmentis 2-4 basi obsolete transversim impressis. — Long., 4 mill.

Sumatra: Palembang; Deli.

DELOPSIS Fauvel.

D. microphthalma *.

D. cornutæ Fvl. sat vicina, similiter colorata et punctata, sed dimidio fere minor, antennis a basi ad medium multo gracilioribus, articulis primis dilutioribus, 1 et 2 rufis; oculis triplo fere minoribus; thorace basi utrinque prope sulcum haud fossato, angulis anticis magis productis; elytris brevioribus, fortiter trans-

versis; abdomine nitido, fortius asperatim punctato facillime distinguenda. — Long., 3 1/3-3 3/4 mill.

Java occ.: Pengalengan, à 1.300^m d'alt.; Mont Gede, vers 2.300^m d'alt., août (*Fruhstorfer*).

OXYTELOPSIS Fauvel.

O. madecassa *.

In genere maximus. *Ox. apicipenni* Fvl. adhuc major, multo latior, antennis crasse clavatis, genis haud angulatis, thorace angusto, optime cordato et abdomine alutaceo, impunctato, primo visu distincta. Opaca, picea, fronte antica, ore, antennarum articulis 4 primis, ano pedibusque squalide rufis. Antennae brevissimae, articulo 4° paulo longiore quam latiore, 5° moniliformi, 6-10 fortiter transversis, 11° brevi, conico. Caput parvum, subtriangulare, licet frontis margine antico fortiter rofundato, utrinque fortiter rugosum, vertice basi media excavato, ante excavationem elevato, minus rugose punctato et minus opaco, fronte late deplanata, alutacea, vix perspicue punctulata, oculis medioeribus, genis post oculos longis, subparallelis. Thorax parvus, transversus, capitis longitudine, hoc tertia parte angustior, dense rugose punctatus, dorso fortiter convexus, margine antico medio valde rotundatim producto, sulco medio late et profunde impresso, basi post sulcum late quasi geminatim impressa, sulcis 2 externis vix perspicuis, lateribus latissime explanatis, medio profunde et late impressis, angulis anticis rotundatis, posticis fere acutis, margine laterali antice parum sinuato. Elytra thorace multo latiora, parum longiora, transversa, versus apicem ampliata, dense rugose striolatim punctata, dorso parum inaequalia, apice extus transversim late impressa. Abdomen late marginatum. Tarsi lati, validi. — Long., 5 1/2-6 mill.

Sexus differentia latet.

Madagascar: Tananarive; forêt de Moramanga (*Sikora*).

Deux exemplaires.

O. genalis *.

O. pseudopsine Fvl. vicina, similiter colorata, sed antice latior;

capite latiore, fortius et parcus rugoso, frontis spatio elevato medio nitido, oculis paulo majoribus, magis proeminentibus, genis post hos haud angustatis, sed fere angulatum dilatatis; thorace adhuc brevior et latiore, fortius rugoso, minus opaco, sulcis latioribus, minus profundis, lateribus angustius explanatis; elytris paulo brevioribus, etiam fortius rugosis optime distincta. — Long., 2 1/2 mill.

Perak.

Unique.

HAPLODERUS Stephens.

H. speculiventris *.

Nitidissimus, rufo-testaceus, longius parce flavopubescens, capite basi et juxta oculos fusco. Antennae capite thoraceque paulo longiores, circa apicem sat incrassatae, articulo 3° 2° tertia parte longiore, 4-5 fere quadratis, 6-10 medioeriter transversis. Caput transversum, juxta oculos alte elevatum, ibique parum punctulatum, sulco inter antennarum basin subarcuato, fronte umbonata, antice longe porrecta; oculis sat magnis, genis post hos rotundatis. Thorax capitis latitudine, transversim subrectangularis, sulco medio parum profundo longitudinali, disco utrinque fossa maxima transversa, punctis aliquot grossis notata, excavato, angulis posticis fere rotundatis. Elytra thorace sat latiora, parum transversa, parum dense sat fortiter subrugose punctata. Abdomen punctis aliquot vix perspicuis notatum, longe et parce setosulum. ♂ Oculis fere dimidio minoribus, genis longioribus, sat dilatatis; thorace utrinque crebrius punctato; elytris etiam paulo fortius punctatis. — Long., 3 mill.

Java: Bandoeng; Sumatra: Deli; Palembang.

OXYTELUS Gravenhorst

A. — ESPÈCES D'INDO-MALAISIE

O. bubalus *.

In vicinitate *Ox. testacei* Mots. collocandus, sed omnino diffinis.

Revue d'Entomologie. — Mai 1904.

♂. Latus, brevis, sat nitidus, piceus vel picco-testaceus, capite et antennis vel nigris, vel piceis, his articulis 5 primis, tuberculis antennariis, palpis pedibusque testaceis; mandibulis rufis aut rufopiceis. Antennae breves, articulo 3° angusto, 4-5 moniliformibus, minutis, 6-11 clavatis, 6° parum, 7-10 fortiter transversis. Caput breve, transversim ovale, parum depressum, plus-minusve longitudinaliter ad verticem sulcatum, subtilissime strigello-punctatum, fronte profundius depressa, antice recte truncata, tuberculis antennariis elevatis, angulatum dentatis; oculis minutis. Thorax duplo latior quam longior, convexus, subsemilunaris, angulis posticis parum indicatis, rotundatis, dorso late parum profunde trisulcatus, sulcis externis obliquis, postice abbreviatis, impressione laterali mediocri, basi subtiliter, lateribus crasse marginatis, subtiliter parum dense strigello-punctatus. Elytra thorace haud latiora, parum longiora, parce punctata, densius et fortius strigella, ad latera et apicem subopaca. Abdomen parum alutaceum. ♀ Minor. Capite parvo, multo minus inaequali, vertice tantum fossulato, post oculos triplo majores strangulato, tuberculis antennariis simplicibus. Thorace multo minore et angustiore, lateribus parum rotundatis. — Long., 2 2/3-3 1/3 mill.

Java: Batavia; Malang; Djatinagara; Palabuan, au vol, juin; Bali, mars, avril.

Espèce assez commune sans doute.

O. atriceps *

Præcedenti vicinus, sed antennis brevioribus, fortius clavatis, articulis 5-10 rufopiceis, maxime transversis, capite picco, in ♂ adhuc latiore et brevior, minus strigello, latius excavato, fronte antice obtuse truncata, oculis triplo majoribus, tuberculis antennariis minus acutis, genis post oculos dilatatis; thorace longiore, testaceo, subtilius sulcato, parce subtilissime punctulato, vix strigello; elytris paulo longioribus, plus minusve fuscis, epipleuris testaceis; ♀ a *bubalo* ♀ antennarum clava rufo-fusca, tuberculis antennariis multo minus elevatis, oculis tertia parte majoribus præcipue distinguenda. — Long., 2 2/3-3 1/3 mill.

Celebes: Macassar, mars; Patunuang, janvier; Samanga, novembre; Bua-Kraeng, vers 1.700^m d'alt., février.

Paraît également commun.

O. megacephalus *.

Prope *Ox. cephalotes* Epp. collocandus, sed corpore antico opaco, abdomine nitidissimo et elytris rufo-testaceo maculatis inter alia omnino distinctus. Latus, brevis, niger, pedibus cum coxis rufis, antennarum articulis 2 primis basi et apice rufulis. Antennae breves, clavatae, articulo 4° moniliformi, 5-10 maxime transversis. Caput in ♂ magnum, subtriangulare, inter oculos et anterius alutaceum, postice fortiter strigosum, fronte praesertim maxime excavata, medio antice nitidula, vix punctulata, margine antico sat profunde bisinuato, tuberculis antennariis parum elevatis, obtuse angulatis; oculis minutis, genis post hos fortiter dilatatis, sulco verticis brevi, profundo. Thorax capitis latitudine, duplo fere latior quam longior, postice fortiter angustatus, angulis posticis obtusis, fortiter strigosus, sulcis 3 disci omnino confusis, obsoletis, impressione transversa utrinque ante medium maxime profunda, lata; disco inter impressiones excavato; basi media late bifossata. Elytra brevissima, thoracis longitudine, fortiter strigosa, utrinque macula confusa ab humero ad apicem triangulariter extensa. Abdomen parum dense subtiliter punctulatum, segmentis 2-5 basi et utrinque fortiter impressis. ♀ Capite dimidio minore, multo minus excavato, toto opaco, oculis minoribus, genis post hos subparallelis; thorace angustiore, disco antice profundius excavato. — Long., 4 1/2-4 2/3 mill.

Sikkim: Darjeeling (*Christie*); Bengale occid.: Kurseong.

O. gigantulus *.

In genere maximus. Forma *sculpturali* Gray. (europaei), sed totus alius. Robustus, opacus, alutaceus, dilute ferrugineus, testaceo variegatus, palpis, antennarum articulis 4 primis pedibusque testaceis, abdominis vitta media nigriflata. Antennae singulares, articulo 1° praelongo, subtus curvato, supra apice longe emarginato, 4° minimo, moniliformi, 5-11 clavatis, 5-10 sat transversis 11° praelongo, parallelo, apice tantum attenuato ibique flavo, articulos quatuor praecedentes simul sumptos aequante. Caput in ♂ maximum, subtriangulare, sat depressum, fronte tota excavata, margine antico late vix sinuatim truncato, utrinque vix denticulato, tuberculis antennariis sat elevatis, obtusis; vertice trisulcato, sulcis 2 externis

obliquis, medio nitidulo, punctulato, extus obsolete striolato; oculis maximis, elongatis, depressiusculis, genis post oculos subangulatum dilatatis, piceolimbatis. Thorax capite paulo angustior, tertia parte latior quam longior, piceolimbatus, lateribus vix sinuatis, postice fortiter angustatis, angulis posticis denticulatis, parce punctulatus, utrinque obsolete striolatus, trisulcatus, sulco medio antice deleto, externis profundis, arcuatis, impressionibus lateralibus parum profundis. Elytra thorace paulo latiora et longiora, parum profunde punctato-striolata, epipleuris, basi et plus minusve prope suturam testaceis. Abdomen impunctatum. ♀ Capite dimidio fere minore, multo minus inæquali, oculis adhuc majoribus, sat convexis, post hos oblique truncato; thorace multo angustiore, longiore, transversim subquadrato; elytris paulo longioribus. — Long., 6 1/2-7 1/2 mill.

Siam: Bangkok; Java; Sumatra: Deli.

O. migrator *

Ox. ferrugineo Kr. ♀ proximus, tertia parte minor, antennis brevioribus, minus crassis, articulis 5-10 fortiter transversis; capite nigritulo, multo angustiore, fortius punctato, vertice striatulo; oculis majoribus, genis post hos nullis; thorace brevior, magis striatulo, profundius sulcato, sulcis externis integris, angulis posticis rotundatis; elytris etiam paulo fortius striatulis; abdomine parce subtilissime asperulo-punctato. — Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Siam: Bangkok; Sumatra: Palembang; Deli; Java: Batavia; Malang.

O. ruptus *

Ox. variipennis Kr. proximus, sed paulo minor, nitidior, antennis brevioribus, articulis 5-10 fortius transversis; capite minore, angustiore, piceo vel rufo-piceo, parcius punctato, fronte nitida, minus producta, margine apicali fere rotundato, verticis sulco longitudinali multo longiore; thorace angustiore, minus transverso, testaceo, præter apicem et laterum tertiam partem anticam piceo limbato, angulis posticis magis obtusis, sulcis infuscatis, 2 externis antè plus minusve abbreviatis; elytris brevioribus, sat fortiter transversis, testaceis, utroque macula lacrymali fusca fere a

basi usque ad apicem producta; abdomine squalide testaceo, vitta media longitudinali fusca sat distinctus. — Long., 3-3 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Java: Monts Tengger, vers 1.300 m d'alt.; Sukabumi. Sumbawa: Mont Tambora, avril, mai. Celebes.

B. — ESPÈCE D'AUSTRALIE

O. heterophthalmus *.

Ox. cribriceps Fvl. vicinus, sed paulo major, minus nitidus, in ♂ antennis magis clavatis, articulis penultimis magis transversis; capite latiore et brevior, subtilius haud strigose punctato, fronte tota latius excavata, spatio antico vix elevato, disco medio profunde longitudinaliter sulcato, oculis duplo fere majoribus, genis post hos magis dilatatis et rotundatis, late rufis; thorace latiore, dilutiore, sicut caput punctato, sulcis disci externis profundioribus; elytris testaceis, strigosis, haud asperulis; abdominis lateribus elevatis testaceis. ♀ a *cribriceps* ♀ præsertim capite multo majore, oculis duplo fere majoribus, thorace latiore et colore distincta. — Long., 3 3/4 4 mill.

Australie: Nouvelle-Galles du Sud.

Le Dr Staudinger m'a envoyé cette espèce comme reçue par lui d'Australie sous le nom d'*impressifrons* Mac Leay; mais la description de ce dernier auteur ne lui convient pas: en effet, chez *impressifrons* la tête serait lisse, la taille de 3 1/3 mill. seulement, etc.

C. — ESPÈCES D'AFRIQUE

O. dilutipennis *.

In sectione *Ox. insecati* Grav. (europæi) collocandus. Nitidus, abdomine nitidulo, piceus, capite nigricante, antennis rufo-piceis, articulis 3 primis, ore, elytris pedibusque flavis. Antennæ robustæ, capite thoraceque paulo longiores, articulo 4° vix, 5-10 parum transversis. Caput in ♂ transversim orbiculatum, convexum, for-

liter punctato-strigosum, totum profunde medio excavatum, medio etiam ante collum fossulatum, fronte angusta, plana, opaca, alutacea, antice truncata, oculis sat minutis, genis post hos usque ad collum oculo multo longioribus, fortiter rotundatis. Thorax capite vix latior, tertia parte latior quam longior, fortiter punctatus, parum striolatus, profunde trisulcatus, intervallis quatuor disci elevatis vix punctatis, impressione laterali parum profunda, lateribus circa basin sat fortiter angustatis ibique laxè crenulatis, angulis posticis rotundatis. Elytra quarta parte latiora quam longiora, sat fortiter parce punctato-striolata. Abdomen alutaceum, punctis aliquot vix perspicuis notatum. ♀ Capite multo minore, brevior, oculis sat majoribus, genis post hos parum angustatis; thorace paulo brevior. — Long., 2 3/4-3 1/2 mill.

Gabon : Libreville. Congo : Kinchassa, mars. Kilimandjaro.

O. planus *.

♂. In sectione *Ox. inusti* Grav. collocandus. Nitidissimus, nigropiceus, thorace piceo, fronte antica, ore, antennarum articulis 4 primis, elytris pedibusque cum coxis testaceis. Antennæ setosæ, tenues, capite thoraceque breviores, articulo 4° minimo, transverso, 5-10 hoc duplo latioribus, fortiter transversis, inter se latitudine æqualibus, 11°. acuminato, duobus præcedentibus simul sumptis æquali. Caput transversim quadratum, antice declivum, parce vix perspicue punctulatum, frontis margine antico subarcuato, oculis sat minutis, subdepressis, genis post hos fere parallelis, vertice a collo medio haud separato, utrinque tantum sulco obliquo impresso. Thorax capitis latitudine, parum transversus, convexus, æqualis, parce subtilissime punctulatus, circa basin sat angustatus, angulis posticis obtusis. Elytra parum transversa, parcius sat fortiter punctata. Abdomen segmento 6° punctis aliquot subtilissimis. ♀ latet. — Long., 3-3 1/3 mill.

Abyssinie : Biakobaba ; Bogos : Sciotel, vers 4.500^m d'alt. ; juin à août. Sierra Leone. Natal.

O. nitidipennis *.

♂. Forma et magnitudine *Ox. plani* Fvl., nitidissimus, rufotestaceus, antennarum articulis 4 primis pedibusque pallidis, antennis

cæterum, elytris abdomineque præter basin infuscatis. Antennæ fere ut in *plano*, sed breviores, articulis 5-11 haud setosis, 5-10 adhuc magis transversis, 11° minore, brevior. Caput subrotundatum, magis convexum, fronte antice breviter paulo fortius impressa, apice quasi triangulariter producta, oculis minoribus, genis post hoc minus parallelis. Thorax convexior, circa basin magis angustatus. Elytra breviora, punctis aliquot vix perspicuis seriatim notata. Abdomen læve. ♀ latet. — Long., 2 2/3 mill.

Madagascar : forêt Tanala (*Alluand*).

Unique.

O. claviger *.

Præcedenti vicinus, similiter nitidus et coloratus, licet elytrorum sutura fusca, antennarum forma et oculis duplo majoribus, convexis, inter alia facillime distinguendus. Antennæ robustæ, capitis thoracisque longitudine, articulo 4° moniliformi, 5-10 latis, haud setosis, sericeis, rufopiceolis, parum transversis, 11° prælongo, oblongo, 8-10 longitudine æquante. Caput in ♂ brevius, sat fortiter parce punctulatum, fronte magis depressa, margine antico medio triangulariter parum producto; vertice vix fossulato, a collo utrinque sulco longiore, minus obliquo separato; oculis sat magnis, genis post hos angustatis. Thorax capite paulo fortius punctatus, obsolete trisulcatus. Elytra quam in *plano* sat latiora et breviora, punctis adhuc parcius subtilioribus notata. Abdomen omnium subtilissime disperse punctulatum. ♀ Oculis tertia parte quam in ♂ majoribus. — Long., 3 1/2 mill.

Variat elytris totis flavis (immaturus).

Abyssinie : Saberguma. Zanzibar. Zambèse.

O. incisicollis *.

♂. Thorace ante angulos posticos rectos incisura triangulari profunde emarginato unicus. *Ox. clavigero* Fvl. vicinus, minor, angustior, nitidissimus, niger, antennarum articulis 5 primis palpisque squalide rufis, his articulo ultimo, elytris fere totis pedibusque cum coxis testaceis. Antennæ paulo breviores. Caput transversim quadratum, parcius subtiliusque punctatum, fronte late et profunde impressa, antice lævi, margine apicali fere truncato; vertice a

collo stria profunde arcuata diviso; oculis sat minutis, genis post hos oculo paulo longioribus, fere parallelis. Thorax antice et postice sat fortiter angustatus, lateribus ante medium vix angulatis, subtiliter sat crebre plagiatis punctulatus, sulco medio obsoleto, antice abbreviato. Elytra quadrata, subtiliter densius punctata, basi, ad suturam et praesertim ad angulum posticum externum infuscata, stria subtilissima longitudinali subhumerali. Abdomen alutaceum, haud perspicue punctatum. ♀ latet. — Long., 2 3/4 mill.

Afrique orientale allemande.

Unique.

O. bicolor *.

Ox. fusciceps Fvl. vicinus, similiter coloratus, adhuc nitidior, antennis brevibus, squalide rufotestaceis, articulis 5-10 maxime transversis, minime setosis et punctura capitis thoracisque dimidio subtiliore praecipue distinctus. Antennae capite thoraceque breviores, articulo 4° minimo, transverso, 11° mediocri, pyriformi. Caput in ♂ magnum, transversim orbiculatum, fronte late excavata, margine antico parum rotundato; oculis magnis, genis post hos brevibus, arcuatim angustatis; vertice minus profunde arcuatim a collo separato. Thorax capitis latitudine, sat transversus, postice sat, angustatus, angulis posticis obtusis, levius trisulcatus utrinque longius impressus, disco inter sulcos fere laevi. Elytra vix parcius punctato-striolata. ♀ a ♂ capite multo minore, subtriangulari, fronte planiore, oculis multo majoribus, genis post hos fere vel omnino nullis; thorace angustiore et minus transverso, lateribus minus rotundatis, angulis posticis magis indicatis differt. — Long., 3 1/2-3 2/3 mill.

Madagascar: Tamatave; Suberbieville; Fort Dauphin. Arabie; Congo: Kinchassa, mars; Cameroun.

O. heterocerus *.

Minimus. Ad sectionem *Ox. tetracarinati* referendus, sed dimidio minor et in sectione antennis maxime elongatis et crassis primo visu maxime distinctas. Opacus abdomine nitido, niger, ore pedibusque squalide testaceis, elytris picescentibus, antennarum articulis 4 primis plus minusve rufis vel rufotestaceis. Antennae

capite thoraceque sat longiores, articulo 3° brevissimo, 4° 3° vix brevior, minimo, quadrato, 5-11 dilatatis, clavam longam formantibus, 5-6 quadratis, 7-10 vix transversis, 11° magno, duobus praecedentibus simul sumptis longiore. Caput in ♂ transversim quadratum, post oculos mediocres parallelum, omnium subtilissime strigellum, longitudinaliter obsolete bisulcatum, spatio inter sulcos basi vix striolato. Thorax capite parum angustior et brevior, fortiter transversus, sicut caput strigellus, trisulcatus, sulcis integris, intermedio antice dilatato, impressionibus lateralibus latis, antice truncatis, lateribus circa basin fortiter angustatis, angulis posticis rotundatis. Elytra thorace parum latiora, sat transversa, parce longitudinaliter strigosula. Abdomen haud perspicue punctatum. ♀ Angustior, capite parvo, post oculo sat angustato et thorace angustiore, minus transverso differt. — Long., 1 1/2-1 2/3 mill.

Gabon: Libreville (*Mocquerys*).

O. sculptiventris *.

♂. Niger, nitidus, thorace vix picescente, antennis piccolis, articulis 4 primis rufis, 11° versus apicem, palpis pedibusque rufotestaceis. Antennae validae, elongatae, capitis thoracisque longitudine, sensim incrassatae, articulis haud transversis. Caput parvum, hexagonum, transversum, medio sat fortiter punctatum, inter tubercula antennaria maxime et crasse elevata sulcatum, spatio frontali elevato fere laevi, antice truncato, vertice bifoveolato, ante foveolas impresso, oculis mediocribus, genis post hos angustatis, striolatis. Thorax angustus, capite quarta parte latior, parum transversus, dorso convexus, parum cordatus, angulis posticis subdentatis, profunde trisulcatus, sulcis 2 externis parum sinuatis, utrinque totus late impressus et fortiter striolatus, crasse marginatus, dorso sat fortiter punctatus. Elytra thorace tertia parte latiora, parum longiora, dense fortiter punctato-striolata. Abdomen alutaceum, punctis aliquot subtilissimis utrinque notatum, segmento 6° subtus medio obtuse producto ibique bicalloso, ante callos parum oblique bicarinato, carinis rufis; 7° medio fortiter conice producto, utrinque profunde subtriangulariter emarginato. — Long., 4 1/2 mill.

Madagascar: forêts au nord de Fort-Dauphin (*Alluaud*).

Unique.

Cette espèce doit former un groupe à part dans le genre.

C. — ESPÈCES DE L'AMÉRIQUE TROPICALE

O. crassus*.

Facie *Platystethum arenarium* Fourc. simulans. Inter majores. Latus, convexus, sat nitidus, abdomine nitidulo, alutaceo, niger, palpis pedibusque plus minusve brunneis, tarsis subtestaceis. Antennæ breves, sensim fortiter clavatae, articulis 4-5 vix, 6-10 maxime transversis, 11° mediocri, pyriformi. Caput in ♂ magnum, maxime transversum, dense fortiter punctato-strigosum, fronte tota late transversim impressa, tuberculis antennariis latissimis, truncatis, inter tubercula spatio plano, transversim striatulo, margine apicali medio parum producto, oculis parvis, genis post hos ampliato-rotundatis, vertice medio parum impresso, obsolete sulcatulo. Thorax capite parum latior, convexus, transversus, semilunaris, margine antico medio rotundatim producto, crebre fortiter ubique sicut elytra punctatus, vix rugosulus, sulco unico sat profundo, postice abbreviato, medio versus latera arcuatim obsolete impressus. Scutellum laeve. Elytra thoracis latitudine, parum transversa. Abdomen fere impunctatum, segmento 7° ventrali apice vix bicalloso. Tibiæ anticae ante apicem acute quadridentatae. ♀. Capite multo minore, subtriangulari, post oculos majores fortiter angustato; thorace antice minus producto. — Long., 5-5 3/4 mill.

Bolivie : pays des Yuracaris (*Germain*).

O. speculum*.

Ox. deraso Sharp vicinus, nitidissimus, plus minusve nigropiceus, elytris disco rarius flavescens, antennarum articulis 4 primis plus minusve rufescentibus, palpis pedibusque cum coxis flavis. Antennæ crassiores, articulis 6-10 crassis, longioribus, parum transversis. Caput in ♂ longius, haud transversum, suborbiculatum, latissime depressum, parce subtiliter punctulatum, foveola minuta media, frontis margine antico producto, dente terminato, oculis mediocribus, genis post hos fortiter rotundatim dilatatis, vertice utrinque fortiter bipunctato, a collo medio haud separato. Thorax magnus, trapeziformis, vix transversus, angulis anticis fere rectis, posticis acutis, lateribus ab apice ad basin

parum angustatis, minime rotundatis, sed exacte obliquis, subtilissime parce punctulatus, sulco longitudinali tenui, sulcis 2 aliis vix perspicuis, impressione obsoleta utrinque exteriore. Elytra thorace parum latiora, haud longiora, parce subtiliter punctata, utroque punctis 3 majoribus. Abdomen laeve, segmento 6° apice medio tuberculo subdentato armato. ♀ Caput dimidio fere minus quam in ♂, transversum, frontis margine obtuse rotundato, genis post oculos fortiter angustatis, fortius punctatum, vertice medio parum sulcato, elytris paulo longioribus. — Long., 4 1/2-5 1/2 mill.

Pérou : Pumamarca, janvier, mars. Amazone : Ega. Guyane sud : rivière Lunier ; bassin du Carsevenne.

O. dentifrons*.

In sectione *Ox. insigniti* Grav. collocandus, multo minor, magnitudine *tetracarinati* Block, ♂ fronte media antice dente spinoso similiter armata. Parum nitidus, piceus, capite nigricante, antennarum articulis 4 primis mandibulisque rufis, palpis pedibusque testaceis. Caput in ♂ late sat profunde arcuatim impressum, vertice medio parum sulcato, angulis posticis rotundatis. Thorax multo angustior quam in *insignito*, angulis posticis bene indicatis, fortius rugosus. Elytra parva, multo subtilius densius striatella, punctis haud perspicuis. ♀ a ♂ capite minuto, transversim orbiculato, fronte antice mutica, fortiter rotundata, vertice rugello praecipue distincta. — Long., 2 1/3-2 2/3 mill.

Amazone : Pebas (*de Mathan*). Antilles : Saint-Vincent (*Smith*).

O. scorio*.

Inter minimos. *Ox. latiusculo* Kr. vicinus, sed corpore antico magis opaco, licet thoracis carinis vix nitidulis, abdomine nitido, capite thoraceque haud strigellis, unice alutaceis, capitis impressionibus antice minus convergentibus; thorace antice latior, lateribus minus rotundatis; elytris alutaceis, punctis asperulis parce notatis; abdomine in ♀ tantum apice vix perspicue punctulato. ♂ Segmento 6° dorsali versus apicem parum asperato, medio spina longa oblique elevata fortiter armato, 7° apice truncato, utrinque vix denticulato insignis. — Long., 1 3/4 mill.

Saint-Domingue, dans des tabacs importés.

Les antennes manquent chez mes exemplaires. L'épine abdominale du ♂ est parfois réduite à un tubercule ou à une carène.

ANISOPSIS *

Genus *Oxytelo* proximum, sed corpore antico supra plus minusve carinato; mento angustiore, trapeziformi; palpis maxillaribus brevioribus, articulis 2-3 latioribus, ultimo brevioribus, angusto, quasi subulato; metasterno antice carinato, apice quasi spatulato; pedibus brevioribus, tibiis intermediis supra versus apicem canaliculatis satis distinctum.

Sexus differentia latet.

Genre africain, dont je ne connais que les deux espèces suivantes :

A. flexuosa *

Parum lata, sat depressa, rufotestacea, capite præter frontem, thoracis disco abdomineque ante apicem vix infuscatis, abdomine pilis omnium minimis ac brevissimis, vix perspicuis, subtus longioribus ornato. Antennæ capitis thoracisque longitudine, sensim versus apicem parum incrassatæ, articulo 3^o 2^o parum brevioribus, 4^o hæud transverso, oblongo, 5-10 sensim fortius transversis, 11^o crasso, brevi, conico. Caput parvum, parum transversum, vertice a fronte ad basin obtuse longitudinaliter bicarinatum, carinarum intervallo sulcato, fronte triangulariter excavata, tuberculis antennariis maxime elevatis et dilatatis, margine apicali emarginato, oculis medioeribus, genis oculi longitudine, angulis posticis rotundatis, sat fortiter sicut collum rugose striolatis. Thorax capite paulo latior, hæud transversus, trapeziformis, circa basin sat angustatus, ad tertiam partem anticam angulatus, subtilius striolatus, foveis octo profunde impressus, 2 in medio disci, anteriore longa, posteriore punctiformi, 2 exterioribus, anteriore oblique sulciformi, posteriore magna, oblonga, fovea alia extus ad latera utrinque a quarta parte antica usque ad angulos posticos obtusos prolongata, fossarum intervallis obtusè costatis. Elytra thorace tertia parte latiora, parum transversa, fortius striolatim punctata, medio longitudinaliter profunde impressa, impressione extus parum costulata. Abdomen obconicum, subtiliter strigellum, segmentis 4 primis basi profunde transversim impressis, subtus sat dense fortiter

punctato-rugosum, segmento 7^o conico. — Long., 3 1/3-3 1/2 mill. Zambèse.

A. carinata *

Angustior, nitidula, abdomine nitido, albotestacea, antennarum articulis 6-11, capite præter frontem anticam, thoracis disco, elytrorum carinis abdomineque præter segmenti 6ⁱ apicem et anum picescentibus. Antennæ breviores, articulo 4^o parum, 5-10 maxime transversis. Caput subquadratum, alutaceum, profunde impressum, fronte summa utrinque cum tuberculis antennariis fortiter elevata, medio apice emarginata, longitudinaliter tricarinatum, carina media antice abbreviata, duabus aliis post tubercula antennaria sitis, postice angulatim elevatis, oculis sat magnis, genis oculo brevioribus, vix dilatatis. Thorax capitis latitudine, hæud transversus, subquadratus, alutaceus, alte tricarinatus, carina media subtilissime sulcatula, antice furcata, duabus aliis parum sinuatis, lateribus late explanatis, margine ipso paulo ante medium fortiter emarginato, angulis omnibus rotundatis. Elytra thorace tertia parte latiora, hæud longiora, utroque præter suturam et latera carinata carinis duabus medio longitudinaliter acutis prædito, intervallis parè subtiliter punctulatis, sat nitidis. Abdomen obconicum, segmentis 2-5 utrinque subfossatis, prope fossas quasi callosum. — Long., 2 1/2 mill.

Zanzibar.

Unique.

Cette espèce est un exemple curieux de mimétisme. Elle a en effet les plus grands rapports de forme et de sculpture avec les *Anictonia* Wasm., genre d'Aléochariens de l'Afrique tropicale.

HOPLITODES *

Insectum parvum, licet tegumento multispinoso vel carinato sicut tibiis difformibus, ampullaceis et cæteris genus permirum constituans. Corpus latiusculum, alatum. Caput basi constrictum. Oculi infra siti, a supero hæud conspicui. Labrum trapeziforme, truncatum. Mandibulæ parvæ, occultæ. Palpi maxillares articulis brevibus, crassis, 2^o brevioribus, ultimo sat elongato, fere subulato. Mentum breve, latum, apice vix rotundatum. Ligula emarginata.

Paraglossæ prominentes. Antennæ breves, fortiter clavatæ. Metasternum antice acutum. Coxæ intermediae vix distantes. Abdomen conicum. Pedes validi, breves. Tibiæ a basi ad medium fortiter ampullaceæ, dense breviter extus spinosulæ, anticæ intus haud emarginatæ. Tarsi graciles, triarticulati, articulis 1-2 brevissimis, æqualibus, 3° duobus aliis simul sumptis duplo longiore, unguis validis.

Sexus differentia latet.

H. echidne *.

Niger, ore, antennis præter clavam fere totam fuscam, segmento 6° apice late, 7° etiam apice pedibusque cum coxis testaceis; capite et thorace fere opacis, elytris vix, abdomine magis nitidis. Antennæ articulo 1° crasso, prælongo, basi subampullaceo, 2° etiam crasso, paulo longiore quam latiore, 3-5 perangustis, minimis, transversis, 6-10 brevissimis, sensim maxime dilatatis, 11° magno, brevi, obtuso. Caput parum transversum, excavatum, frontis margine dentibus 6 magnis, laminatis armato, quarum duæ apicales minores, obtusæ, verticis dentibus 4 aliis elevatis, quarum duæ intermediae minutæ, vertice subtus utrinque dente alio prædito. Thorax (spinis lateralibus exceptis) haud latior quam longior, lateribus utrinque maxime hispinosis, spinis sat elevatis, disco dentibus 9 magnis (4-3-2) elevatis ornato, ante basin breviter sulcato. Elytra brevissima, duplo latiora quam longiora, parce sat fortiter rugosula, lateribus ad humerum et ante apicem fortiter dentatis, utroque disco alte bicarinato, carina exteriori sinuata. Abdomen segmentis 5 primis margine elevato fortiter dentato, prope marginem carinatis, medio bituberculatis, sat dense parum fortiter punctatum, carinis, tuberculis et punctis plus minusve brevissime setosis; subtus quasi striatim fortiter punctato-asperatum, breviter flavo-setosulum, segmento 7° perangusto, apice truncato. — Long., 3 mill.

Natal.

Ce petit Staphylinide est un des plus singuliers de forme et de sculpture que je connaisse.

BLEDIUS Mannerheim

B. bellicosus *.

In vicinitate *Bl. unicornis* Germ. (europæi) collocandus, sed omnino diversus. Sat latus, nitidus, parce breviter griseo-pubes-cens, niger, capitis thoracisque cornubus et spinis anoque piceis, antennis pedibusque rufo-testaceis. Antennæ graciles, articulo 3° 2° paulo brevior, 4-5 haud transversis, 6° moniliformi, 7-10 parum transversis. Caput in ♂ nitidissimum, politum, fortiter excavatum, supra antennis spina magna parum arcuatim erecta, vertice medio carina robusta, apice dente erecto terminata, prædito. Thorax capite parum latior, convexus, quadratus, lateribus prope medium sat sinuatim emarginatis, dein ad angulos posticos rotundatos fortiter angustatis, supra subtiliter parum dense punctatus, a medio ad basin tenuissime sulcatus, ante sulcam carinatus, carina antice supra caput in spinam plus minusve longam, arcuatam continuata. Elytra thorace paulo latiora, quadrata, sat crebre fortius punctata. Abdomen punctis aliquot vix perspicuis notatum. ♀. Antennis brevioribus, capite thoraceque inermibus; illo opaco, medio rufulo, vertice medio unifoveolato; hoc sulco longitudinali profundiore, integro impresso. — Long., 4-5 mill.

Sumatra. Bornéo orient. : Batoe Panggal. Java : Soerabaja, décembre; Ardjoeno. Sumbawa. Celebes : Macassar, janvier; Bangka.

La carène dentée de la tête est parfois réduite à un tubercule et alors les épines de la tête et du corselet sont moins longues. Chez les exemplaires moins matures, la couleur des élytres passe au rougeâtre.

B. conicicollis *.

Bl. crassicolli Lac. (europæo) vicinus, sed multo latior, tertia parte major, thorace nitidissimo, obconico, sulcato inter alia distinctus. Nitidus, capite opaco, parce flavo-pubes-cens. Niger, ano piceo, ore, antennis, tuberculis antennariis pedibusque rufis, elytris vix nigro-piceis. Antennæ magis clavatæ, articulis 8-10 fortiter transversis. Caput majus, convexus, parce vix perspicue punctulatum, vertice medio fovea notato; oculis duplo majoribus. Thorax vix transversus, exacte obconicus, basi minus angustatus, angulis posticis rotundatis, dorso longitudinaliter sulcatus, punc-

tura quam in *crassicolli* vix fortiore et parciore. Elytra ampliora, tertia fere parte longiora quam latiora, crebre paulo fortius punctata. Abdomen latum, segmentis 2 5 parce sat grosse punctatis — Long., 4 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Tonkin.

Unique.

B. arenicola *.

Bl. Husseini Quedf. proximus, sed elytris brevioribus, aliter coloratis et punctura præsertim distinguendus. Caput et thorax fere glabra, subopaca, elytra vix nitidula, crebre brevissime flavo-pubescentia, abdomen nitidissimum, glabrum. Niger, elytris flavis, sutura anguste cum scutello punctoque humerali brunneis; palpis antennarumque apice vix infuscatis, his cæterum pedibusque testaceis. Antennæ in ♂ minus incrassatæ et longiores quam in *Husseini* ♂, articulis omnibus longioribus, 8-10 haud transversis. Caput inter tubercula antennaria recte et profunde transversim sulcatum, haud perspicue punctatum, vertice medio foveola omnium minutissima impresso. Thorax vix brevior, paulo densius et subtilius punctulatus. Elytra breviora, quadrata, paulo fortius punctulata. Abdomen fere impunctatum. ♀ Antennis brevioribus et capite minore a ♂ distincta. — Long., 2 2/3-3 mill.

Côte de Malabar : Mahé, juillet.

B. Helfer *.

In vicinitate *Bl. pulchelli* Kr., sed totus alius. Minor, subopacus, abdomine nitidulo, elytris sat longe aureo-pubescentibus. Piceus, capite nigro, ore, antennis pedibusque testaceis, utroque elytro macula albida magna triangulari usque ad suturæ apicem producta. Antennæ breves, articulis 6-10 fortiter transversis. Caput subtilissime rude punctulatum, puncto verticis minimo fossulato. Thorax vix transversus, antice crebre punctulatus, postice fere impunctatus, lateribus antice parallelis, postice maxime angustatis, sulco medio tenuissimo. Elytra paulo longiora quam latiora, omnium creberrime punctulata. Abdomen fere impunctatum. — Long., 2 1/2 mill.

Birmanie.

Unique.

FAUNE ANALYTIQUE

DES

COLÉOPTÈRES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

PAR ALBERT FAUVEL

2^e PARTIE (1)

BUPRESTIDÆ

TRIBU BUPRESTINI

Phospheres Thomson

Ce genre ne renferme que les deux espèces suivantes.

- Elytres vertes, immaculées. Dessous à pubescence laineuse, dorée. *chrysocomus*.
- Elytres noirâtres, à taches orangées ou rouges. Dessous à pubescence courte, argentée. *aurantiopictus*.

1. **P. chrysocomus** * Fvl., *Rev. d'Ent.*, 1891, 175.

Ile des Pins (D.).

Deux exemplaires.

(1) Voir: 1^{re} Partie, *Rev. d'Ent.*, 1903, p. 203 à 379.