



déprimé, peu brillant en entier, 8° arceau convexe, atténué en cône, couvert de soies noires courtes, hérissées, peu serrées, 10° arceau formé de deux valves accolées en toit et très densément hérissées de poils très fins comme une efflorescence de moisissure. — Long. 25 mill. — Séville.

49. ERYTHROGASTER LÖW

Löw, Suites à Meigen, II, 120 (*Eccoctopus*, id.)

Le ♂ de la collection Gobert ressemble tout à fait à la ♀. Il s'en distingue par son abdomen plus cylindrique, 9° arceau roux, les valves droites, arrondies au bout, sans pincé marquée. Ventre, 8° et 9° arceaux tronqués sans frange, valves externes renflées à la base, à villosité couchée, atténuées en languette vers le bout qui est arrondi en onglet; valves internes cariniformes, simples, dépassant à peine les externes en onglet, style étroitement triangulaire à la base, en tranche au milieu, terminé par trois épines en éventail.

SUR UNE TRIBU NOUVELLE DE STAPHYLINIDES

PAR ALBERT FAUVEL

TRIBU NEOPHONI

Antennæ filiformes, sub frontis margine laterali tuberculatim elevato insertæ, articulis 3 ultimis clavulatis. Ocelli nulli. Thorax subtus prope coxas anticæ coriaceus. Coxæ anticæ obconicæ, prominentes. Coxæ posticæ conicæ. Prosternum simplex. Mesosternum carinulatum. Metasternum apice medio foveatum. Abdomen segmento 2° ventrali basi media haud plicatum. Tarsi triarticulati.

Cette tribu se place avant les *Homaliini*, dont elle se distingue notamment par l'absence d'ocelles, ses antennes à massue de trois articles et ses tarses trimères.

Je l'ai établie sur le genre suivant :

Neophonus*.

Corpus oblongum, convexum. Caput pentagonale, a thorace collo divisum. Oculi prominentes. Labrum transversum, medio apice arcuatim emarginatum. Mandibulæ minutæ, occultæ. Maxillæ latæ, intus barbatae, extus lobo lato, apice oblique truncato, membranaceo, translucido, ultra labri latera extenso, præditæ (Palpi desunt). Mentum breviter trapezoidale, apice truncatum. Ligula minuta, obconica. Coxæ anticæ contiguæ, intermediæ approximatae, posticæ parum distantes. Pedes graciles, tibiis pubescentibus, tarsis sat elongatis, triarticulatis, articulo 2° 1° fere dimidio brevior, 3° duobus præcedentibus simul sumptis fere longior, unguis subtus basi denticulatis.

Par son faciès ce genre remarquable rappelle assez les *Trigonomus* Lec. et *Tanyrrhinus* Mann., de l'Amérique septentrionale; la forme et la sculpture du corselet et des élytres sont très analogues à celles du *Tanyrrhinus*; la tête est voisine de celle du *Trigonomus*.

N. Bruchi*.


Nitidissimus, glaber, niger, capite, abdominis segmentis 6-7 coxisque squalide rufis, antennis rufis, clava pedibusque testaceis, elytrorum margine inflexo et margine apicali declivi plus minusve rufis, subtus piceo-rufescens. Antennæ elongatæ, articulis 1-2 crassioribus, 3° 2° vix longior, 4-7 inter se æqualibus, 8° paulo brevior, 9° obconico, latior, 10° etiam obconico et latior, 11° longior, ovali. Caput impunctatum, a tuberculis antennariis usque ad basin triangulariter profunde sulcatum, fronte inter antenas profunde impressa, oculis magnis, temporibus his longitudine æqualibus, postice rotundatis. Thorax parvus, convexus, angustus, capitis cum oculis latitudine, haud longior quam latior, anticæ conice attenuatus, medio angulatus, postice oblique minus angustatus, sat dense fortiter subrugose punctatus, impressione discali ante basin triangulari, profunda. Scutellum sat magnum, triangulare, læve. Elytra prælonga, convexa, basi thorace duplo latiora, plus quam duplo longiora quam latiora, a basi usque ad apicem sat ampliata, apice fere recte truncata, humeris callosis, lævibus, regulariter striato-punctata, striis in utroque novem apice et versus suturam profundioribus, suturali et 1^a dorsali maxime

profundis, punctis striarum apice deletis, interstriis praesertim 3 primis totis et caeteris apice elevatis, externis planellis, sutura quasi carinata. Abdomen conicum, segmento 1° perspicuo sat subtiliter parce, 2° versus latera tantum punctatis. Subtus dense fortiter punctatus, metasterno apice et fossa metasternali laevibus. — Long., 3 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

République-Argentine : province de Neuquen ; décembre (C. Bruch).

Je suis heureux de dédier ce curieux insecte à M. C. Bruch, qui a bien voulu m'offrir l'exemplaire unique de sa collection, et y a joint le dessin reproduit ci-dessous.



Neophonus Bruchi Fauv.

Obs. — Comme ce dessin ne rend pas suffisamment compte de la régularité des stries élytrales, le lecteur est prié de se reporter *ad hoc* à la description.

Les *Dasycerus* algériens

Par MAURICE PIC

Dans son important et précieux travail d'ensemble sur les *Lathridiidae*, paru dans cette *Revue*, il y a plusieurs années (t. XVI, 1897, p. 105 à 221) le R. P. Belon a donné (p. 125) un synopsis du genre *Dasycerus* Brongn., dont je me suis inspiré pour étudier deux nouveautés algériennes de ce genre.

Peut-être quelque collègue sera-t-il étonné que je publie aujourd'hui un article sur les Lathridiens, au lieu de voir le R. P. Belon, universellement connu et apprécié comme spécialiste, se charger de ce soin. Je dois avant tout quelques explications pour ceux qui ne seraient pas au courant des tristes événements qui se sont accomplis ces dernières années. Obligé de partir pour l'étranger, notre savant et sympathique collègue a dû faire le sacrifice de sa collection (1), en renonçant à ses chères études; maintenant nous portons malheureusement, au point de vue entomologique, le deuil d'un pauvre exilé. Si je publie quelque chose sur le genre *Dasycerus*, c'est parce que notre très regretté collègue n'est plus là pour le faire avec sa grande compétence et que je me reprocherais de laisser complètement dans l'oubli l'étude d'une modeste famille de Coléoptères précédemment étudiée par un maître. Puissent les sentiments qui me poussent à l'étude des Lathridiens me servir d'excuse dans ce premier essai, et aider à ce qu'il soit accepté avec bienveillance. Dans son travail précité (l. c. p. 170), le P. Belon signale une seule espèce en Algérie, venant de la forêt de l'Edough, le vulgaire *sulcatus* Brongn., mais cette provenance n'est pas indiquée postérieurement dans le *Genera* de cet auteur (*Gen. Ins., Lathridiidae*, 1902, p. 12); je n'affirmerai donc pas la présence certaine de cette espèce en Algérie.

(1) L'intéressante collection des Lathridiens du P. Belon est chez moi et c'est avec un sentiment de gratitude et de pieux souvenir que je la conserve de mon mieux sans pouvoir malheureusement, dans mon ignorance, l'utiliser au point de vue scientifique comme elle le mérite.