

Trois Staphylinides nouveaux de Barbarie

Par ALBERT FAUVEL

Homalium Vaulogeri *.

D'un testacé rougeâtre; tête noire; disque du corselet et de l'abdomen enfumé. Voisin de l'*Allardi* Fairm., mais très distingué par ses antennes d'un testacé rougeâtre, plus fines, plus courtes; la tête plus petite, plus étroite, les tempes presque moitié plus longues derrière les yeux, légèrement dilatées-anguleuses; ceux-ci plus petits; le corselet plus court, plus large en avant, plus brièvement et profondément sinué-rétréci en arrière, les deux fosses discoïdales plus larges, plus profondes, très marquées en avant, les côtés largement explanés en avant jusque derrière les tempes; les élytres bien plus courtes, à sculpture analogue, mais non striolées surtout vers l'extrémité; l'abdomen plus visiblement pointillé. — Long., 2 2/3 mill.

Tunisie: Kairouan (*Vauloger*).

Unique.

Atheta (Aloconota) chiffana*.

♂. Taille, facies et coloration de l'*appulsa* Scriba (*immatura* Rey), mais distincte par son avant-corps moins brillant, plus densément et finement ponctué, à pubescence grise encore plus dense et plus soyeuse; le corselet plutôt alutacé que ponctué, avec le disque très largement et peu profondément impressionné, sans trace de sillon; l'abdomen un peu moins densément ponctué, surtout au 5^e segment; enfin, par le 7^e segment dorsal comme chez *diodon* Fvl., c'est-à-dire légèrement bidenté seulement au milieu de son bord apical. Différente d'ailleurs de *diodon* par sa taille plus petite, sa forme plus étroite et plus parallèle, l'avant-corps bien

plus mat, à ponctuation moitié plus dense et plus fine, la pubescence aussi beaucoup plus fine et plus serrée, soyeuse, le corselet plus étroit, etc. — Long., 2 1/2 mill.

Algérie: vallée de la Chiffa, forêt des Mouzaïa (*de Peyerimhoff*): Bougie, mai (*Lethierry*).

Deux exemplaires ♂. Le petit tubercule du 6^e segment abdominal est comme chez *diodon* et *appulsa*.

Geostiba Peyerimhoffi *.

♂. Voisine de *circellaris* Grav., mais moitié plus petite, la tête, le corselet, les élytres et les segments 2-3 et 6-7 de l'abdomen d'un roussâtre enfumé; antennes plus fines, à 4^e article moins transverse; tête plus visiblement, éparsément pointillée; yeux bien plus petits; corselet bien plus étroit, à peine plus large que la tête, bien moins arrondi sur les côtés, qui sont peu rétrécis en arrière, plus éparsément ponctué, tronqué à la base avec une assez large fossette basale; élytres convexes, seulement obliquement déprimées de l'épaule à l'extrémité de la suture, bien plus étroites et plus courtes, densément, mais moins fortement ruguleuses, relevées en pli obtus le long de la suture; abdomen à ponctuation plus rare; carène du 6^e segment un peu plus obtuse, les 2 carinules du 7^e identiques. ♀ Distincte du ♂ par les élytres à peine relevées le long de la suture et l'abdomen simple. — Long., 1 3/4-2 mill.

Vallée de la Chiffa, forêt des Mouzaïa (*de Peyerimhoff*).