

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE  
DES  
**STAPHYLINIDES DE LA FAUNE GALLO-RHÉNANE**

Avec l'addition synonymique des espèces  
EUROPÉENNES, SIBÉRIENNES, CAUCASIQUES ET MÉDITERRANÉENNES  
ET DESCRIPTIONS NOUVELLES.

## STAPHYLINIDÆ.

## Sous-FAMILLE I. — MICROPEPLIDÆ Lec.

## MICROPEPLUS Latr.

## Groupe 1.

3. fulvus Er. Fvl., 10 (4).  
 4. longipennis Kr. Fvl., *l. c.*  
 5. staphylinoides Marsh. Fvl., *l. c.*

\*\*

4. porcatus Payk. Fvl. Fn., 9.  
 2. cælatus Er. Fvl., *l. c.*

## Groupe 2.

6. tesserula Curt. Fvl., 11.

Sous-FAMILLE II. — STAPHYLINIDÆ (*Genuini*).

## TRIBU I. — PESTINI Kraatz.

## SECTION I — PESTI Fvl.

- THORACOPHORUS Mots.  
*Glyptoma* Er.  
 7. corticinus Mots. Fvl., 15.  
 SIAGONIUM Kirb. et Spenc.  
*Prognatha* Latr.  
 8. quadricorne Kirb. et Spenc. Fvl., 16.

9. humerale Germ. Fvl., *l. c.* (2).

- SECTION II. — TRIGONURI Fvl.  
 TRIGONURUS Muls.  
 10. Mellyi Muls. Fvl., 17.  
 11. asiaticus Reiche. Fvl., 18.

(1) 2 a. *latus*\* Hampe, Wien. Ent. Mon., 1861, 65. — Croatie.

(2) 9 a. *vittatum*\*.

♂ Primo visu a *quadricorne* capitis forma abdomineque impunctato, ab *humerali* stature magis elongata, antennis multo minus elongatis, robustis, articulis vix dimidio brevioribus, capite breviter ovato, tertia parte angustiore, mandibulis dimidio brevioribus, multo minus arcuatiss, spinis frontalibus triplo minoribus us brevibus, intus convergentibus, vertice non excavato, thorace longiore, cordato minus piano, lateribus antice posticeque minus angustatis, angulis anticis subrectis elytris non strigosulis, testaceis, sutura late vittatim, apice anguste picelis distinctum; ♀ latet. — L., 4 1/2-5 mill.

Sous les écorces. — Sibérie orientale, Vladivostok (*de Solsky*).

## TRIBU II. — PHLOEOCHARINI Kraatz.

SECTION I. — OLISTHÆRI Fvl.  
OLISTHÆRUS Er.

12 substriatus Gyll. Fvl., 20.  
13 megacephalus Zett. Fvl., l. c.

SECTION II. — PHLŒOCHARI Fvl.

PHLOEOCHARIS Mann.

*Scotodytes* Saulc. — *Thermocharis* Fvl.

Groupe 1 (*Phlœocharis* Gen.).

14 subtilissima Mann. Fvl., 21 (1).  
†15 minutissima Heer. Fvl., l. c.  
(*Spec. max. dub.*).

Groupe 2 (*Scotodytes* Saulc.—*Thermocharis* Fvl.).

\*

16 laticollis Fvl. *Suppl.*, 25.  
17 corsica Fvl. *Suppl.*, 4.  
†18 brachyptera Sharp. Fvl. *Suppl.*, 2.

\*\*

†19 paradoxa Saulc. Fvl. *Suppl.*, 1.  
ceca Fvl. *Fn.*, 22.

†20 Diecki Saulc. Fvl. *Suppl.*, 2.

PSEUDOPSIS Newm.

21 sulcata Newm. Fvl., 23.

## TRIBU III. — PROTININI Kraatz.

PHLOEOBIUM Er.

Metopsia Woll.

22 clypeatum Müll. Fvl., 25.

MEGARTHRS Steph.

23 depressus Payk. Fvl., 26.

24 nitidulus Kr. Fvl., 27.

25 affinis Mill. Fvl., l. c.

26 denticollis Beck. Fvl., 28.

27 sinuatocollis Lac. Fvl., l. c.

28 hemipterus Ill. Fvl., l. c.

PROTINUS Latr.

29 limbatus Mækl. Fvl., *Fn.*, 30;  
*Suppl.*, 3 (2).

30 ovalis Steph. Fvl., l. c. (3).

31 brachypterus Fabr. Fvl., 31.

32 macropterus Gyll. Fvl., l. c.

33 atomarius Er. Fvl., *Fn.*, 31;

*Suppl.*, 3.

(1) + 13 a. *longipennis*\*.

*Ph. subtilissima* vix minor, magis parallela propter thoracem elytris non ampliorum; subtilius breviusque auroe-pubescentes, rufo-picea, abdomen piceo, ore, antennis, elytris, segmentorum marginibus latius, ano pedibusque rufo testaceis, antennarum articulo 9° multo minore, angustiore; thorace angustiore, transversim subquadrato, elytrorum latitudine, lateribus subparallelis, angulis posticis subrectis; elytris thorace dimidio longioribus, dense subtiliter, minime asperatim, ab domine densius, subtiliusque punctulatis. — L., 1 1/2 mill.

Syrie, Béthlém (de la Brûlerie).

(2) + 28 a. *\*longicollis* Gredier, *Har. Col. Heft.*, 1874, XII, 52. — Sud du Tyrol.

+ 28 b. *\*laevigatus* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1871, III, 174. — Kiew.

(3) + 30 a. *\*egregius* Redt. *Fn. Austr.*, ed. 3, 1874, 550. — Autriche.

## TRIBU IV. — HOMALINI Kraatz.

ANTHOBIUM Steph.

Eusphalerum Kr.

Groupe 1 (*Anthobium* gen.).

34 atrum Heer. *Fvl. Fn.*, 36; *Suppl.*, 3.

35 florale Panz. *Fvl.*, 37.

Groupe 2 (*Eusphalerum* Kr.).

36 abdominalis Gray. *Fvl.* l. c.

37 signatum Mærk. *Fvl.* l. c.

38 limbatum Er. *Fvl.* l. c.

39 Octavii *Fvl.*, 39.

40 procerum Baudi. *Fvl.* l. c.

41 primula Steph. *Fvl.* l. c.

42 oblitum Fairm. *Fvl.*, 40 (1).

Groupe 3.

\*

43 aucupariae Kiesw. *Fvl.* l. c.

44 torquatum Marsh. *Fvl. Fn.*, 41; *Suppl.*, 4.

45 nigriceps Fvl., 41; *Suppl.*, 4.

46 pruinatum Fvl., 42 (2).

47 hispanicum Ch. Bris. *Fvl. Suppl.*, 4 (3).

48 ophthalmicum Payk. *Fvl. Fn.*, 42; *Suppl.*, 4 (4).

49 Kraatz Ch. Bris. *Fvl.*, 43.

\*\*

50 robustum Heer. *Fvl.* l. c.

51 sinuatum Fvl., 44 (5).

52 obtusicolle Fvl. *Suppl.*, 47.

53 minutum Fabr. *Fvl.*, 44; *appendiculatum*\* Heer. *Fn. Helv.*, I, 481.

brevicollis\* Heer, l. c., 568.

54 impressicollis Kiesw. *Fvl.*, 45.

55 anale Er. *Fvl. Fn.*, 45; *Suppl.*, 26 (6).

difficile\* Rosh. *Thier. Andal.*, 87.

56 longulum Kiesw. *Fvl.*, 46.

57 nitidicollis Baudi. *Fvl.* l. c.

58 angustum Kiesw. *Fvl.*, 47.

59 angusticollis Fvl., l. c. (7).

60 foveicollis Fvl., l. c. (8).

(1) + 42 a. *\*obsoletum* Er., *Gen.*, 892. — Portugal.

(2) 46 a. *Scriba*\* Schauf. *Sitz. Ges. Isis.*, 1862, 147. — Scrib., *Berl. Ent. Zeit.*, 1868, 160. — *obscurum*\* Ch. Bris., *Ann. Ent. Fr.*, 1866, 361. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 400. — Espagne.  
+ 46 b. *\*fulvipenne* Solsky, *Expl. Turkest.*, 1874, II, V, 210. — Turkestan, Khokand.

(3) 47 a. *clavipes*\* Scrib., *Berl. Ent. Zeit.*, 1888, 159. — Mars., l. c., 402. — Apennins.

47 b. *tempescivum*\* Er., *Gen.*, 895. — Corse, Sardaigne.

47 c. *microcephalum*\* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 543. — Hochh., l. c., 1862, III, 108. — Caucase.

+ 47 d. *\*atriceps* Mots., l. c. — Hochh., l. c., 109. — Caucase.

(4) + 48 a. *\*rufostaceum* Mots., l. c. — Hochh., l. c., 111. — Caucase.

(5) 51 a. *luteicorne*\* Er., *Gen.*, 897. — *maculicollis*\* Fairm., *Ann. Ent. Fr.*, 1860, 164. — *cincticollis*\* Chevrol., *Rev. Zool.*, 1860, 448. — Sicile, Algérie.

(6) + 55 a. *\*montanum* Er. *Gen.*, 897. — Kraatz, *Nat.*, 4012 (? *anale* var.). — Suisse, Allemagne.

(7) 59 a. *lapponicum*\* Mann. *Brach.*, 52. — Er., *Gen.*, 899. — Rye, *Ent. Annual*, 1867, 69. — *flavipenne* Er. l. c., 896. — Laponie.

+ 59 b. *\*granulipenne* J. Sahib. *Nat. Fn. Fl. Fenn.*, 1874, 424. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 406. — Laponie.

59 c. *nigriventris* Mots. *Bull. Mosc.*, 1860, II, 544. — Sibérie orient.; Baïkal.

(8) + 60 a. *\*puncticollis* Greil. *Karf. Tiroli.*, 1863, 125. — Mars., l. c., 401. — Tiroli,

- 61 alpinum Heer. Fvl., 48.  
 62 sordidulum Kr. Fvl., l. c.  
 63 umbellatarum Kiesw. Fvl., 49(1).  
 64 palligerum Kiesw. Fvl., l. c.  
 65 sparsum Fvl. Suppl., 48.  
 66 longipenne Er. Fvl., 50.  
 67 macropterum Kr. Fvl., 51.  
 68 stramineum Kr. Fvl., l. c.  
 69 pallens Heer. Fvl., l. c.  
 70 rectangulum Fvl., 52.  
 71 Marshami Fvl., l. c.  
 72 sorbi Gyll. Fvl., 53.  
 73 rhododendri Baudi. Fvl., l. c.  
  
**HADROGNATHUS** Schaum.  
**Oncognathus** Lac. — **Eugnathus** Muls.  
 74 longipalpis Muls et Rey. Fvl. Fn., 55; Suppl., 5.  
  
**PYCGOGLYPTA** Thoms.  
 75 lurida Gyll. Fvl., 54.  
  
**ACRULIA** Thoms.  
 76 inflata Gyll. Fvl., 56.  
  
**HOMALIUM** Grav.  
  
**Phleconomus** Heer. — **Xylodromus** Heer.  
 — **Ochthexenus** Mots. — **Acrolocha** Thoms. — **Etheothassa** Thoms. — **Hapalaraea** Thoms. — **Phæostiba** Thoms. — **Phyllobrepa** Thoms. — **Distemmus** Lec.  
  
**Groupe 1** (*Acrolocha* Thoms.).  
 77 amabile Heer. Fvl. 59.  
 78 striatum Grav. Fvl. Fn., 60; Suppl., 6 (2).  
 79 sulcolum Steph. Fvl. Suppl., 6.

- Groupe 2.**  
 80 rufulum Er. Fvl. Fn., 60; Suppl., 7.  
  
**Groupe 3** (*Hapalaraea* Th.).  
 81 distincticorne Baudi. Fvl., 64.  
 82 pygmaeum Payk. Fvl., l. c.  
  
**Groupe 4** (*Phyllodrepa* Th.).  
 83 salicis Gyll. Fvl., 62 (3).  
 84 rufipes Fourc. Fvl., l. c. (4).  
 85 melanocephalum Fabr. Fvl., 63.  
 86 iopterum Steph. Fvl., 64.  
 87 gracilicorne Fairm. Fvl. Fn., 64; Suppl., 7.  
 88 vile Er. Fvl. Fn., 65; Suppl., 8 (5).  
 89 scabriuscum Kr. Fvl., 66 (6).  
 90 lineare Zett. Fvl., l. c.  
 91 testaceum Er. Fvl., 67; Suppl., 28.  
  
**Groupe 5** (*Etheothassa* Th.).  
 92 deplanatum Gyll. Fvl., 68.  
 93 concinnum Marsh. Fvl., l. c. (7).  
  
**Groupe 6** (*Phæostiba* Th. — *Distemmus* Lec.).  
 94 lapponicum Zett. Fvl., 69.  
 95 planum Payk. Fvl., 70 (8).  
  
**Groupe 7** (*Xylodromus* Heer.).  
 96 monilicorne Gyll. Fvl., l. c.  
  
**Groupe 8** (*Phæconomus* Heer.).  
 97 pusillum Grav. Fvl., 71.  
 98 minimum Er. Fvl., l. c.

- (1) + 63 a. *otolicum*\* Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1858, 429. — Grèce, Sicile.  
 (2) + 76 a. *bacalicum* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 554. — Hochh. l. c., 1862, III, 107. — Sibérie orient.  
 (3) 83 a. *strigipenne*\* Mäekl. Bull. Mosc., 1852, II, 320. — Sitkha; Amour.  
 (4) + 84 a. *translucidum* Kraatz, Nat., 998. — Allemagne mér.  
 (5) + 88 a. *nigriventris* Rosh. Thier. Andal., 86. — Malaga.  
 (6) + 89 a. *striatipenne*\* Aubé, Ann. Ent. Fr., 1850, 321. — Caucase.  
 (7) + 93 a. *caucasicum* Kol. Melet. Ent., III, 28. — Caucase; Transcaucase.  
 (8) + 95 a. *brevipenne* Mots., Bull. Mosc., 1860, II, 345. — Sibérie orient. (Sp. dub.).

- 142 validum Kr. Fvl., 77.  
 143 rivulare Payk. Fvl., 78.  
 144 porosum Scrib. Fvl., l. c.  
  
**CORYPHIUM** Steph.  
**Harpognathus** Westw. — **Macropalpus** Cussac.  
 145 angusticolle Steph. Fvl., 80 (5).  
  
**EUDECTUS** Redt.  
 + 146 \*Giraudi Redt. Fvl., 79 (6).  
 + 147 \*Whitei Sharp. Fvl., l. c. (Prael. ced. similis?)  
  
**BOREAPHILUS** Sahlb.  
**Chevrieria** Heer.  
 148 velox Heer. Fvl. Fn., 81; Suppl., 10 (7).

- (1) + 99 a. *apicorne* Solsky, Expl. Turkest., 1874, II, V, 207. — Turkest., Bonkharie.  
 + 99 b. *taschkentense* Solsky, l. c., 208. — Turkestan.  
 + 99 c. *turanicum* Solsky, l. c., 209. — Samarkand.  
 + 99 d. *strigicollis* Wankow., Ann. Ent. Fr., 1869, 419. — Mars., L'Abeille, 1874, VIII, 395. — Lithuania.  
 + 99 e. *bipunctatum* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 545. — Hochh. l. c., 1862, III, 105. — Pologne.  
 + 99 f. *cinnamomeum*\* Kraatz, Nat., 1000. — Dalmatie.

- (2) + 102 a. *Saulcyi*\*.  
 Magnitudine formaque *rivulari* vicinum, punctura *cæso* magis affine, capite thoraceque aeneo-viridis, elytris vix aeneis insigne; nigrum, capite, thoraceque sat nitidis, densa fortiter, elytris rugulose fortiter crebreque punctatis, antennis articulis 8-10 laetioribus, transversis, 10 piceo; capite fronte antice lœvi, nitidissima, inter antennas biimpresso interque oculos bifoveolato; thorace amplio, transverso, circa basin parum angustato, angulis posticis rectis, dorso profunde bifoveolato, utrinque impresso; scutello lœvi; elytris amplis, thorace tertia parte circiter longioribus, apice subrotundatis, equalibus, castaneis, humeris apiceque dilutis; ano pedibusque rufis. — L., 2 2/3-3 mill.

- Syrie, Borak, Damas (*da la Brâlerie*).  
 102 b. *Escayraci*\* Saulcy, Ann. Ent. Fr., 1864, 659. — Mars. l. c., 394. — Chypre, Syrie.

- (3) + 103 a. *impressum* Kraatz, Nat., 982 (nec Heer). — Allemagne mér. (Sp. dub.).  
 (4) + 105 a. *littorale* Kr. Nat., 980 (nec Thoms.). — Swinemünde.  
 (5) + 145 a. *Gredleri*\* Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1870, 416. — Mars., L'Abeille, 1874, VIII, 290. — *obscurellum*\* Heyden, in litt. — Tyrol, Bernina.

- (6) Avant les Eudectus se place le genre :  
**NIPHETODES** Miller  
 Verh. Zool. Bot. Ges. Wien., 1868, XVIII, 46.  
 + 145 b. *Redtenbacheri* Miller. l. c. — Mars., L'Abeille, 1871, VII, 143. — Carpathes.  
 (7) 148 a. *Henningianus*\* Sahlb. Ins. Fenn., I, 433. — Er. Gen., 899. — Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1857, 41, pl. I, IV, fig. b. — Lapponie, Russie sept.  
 + 148 b. *astur* Sharp. Ann. Soc. Hisp. Hist. Nat., 1873, I, 266. — Asturias.

- MICRALYMMMA Westw.  
 149 marinum Stroem. Fvl., 82 (1).  
 PHILORINUM Kraatz.  
 120 sordidum Steph. Fvl. Fn., 84;  
*Suppl.*, 10.  
 †121 pallidicorne Fairm. Fvl. l. c.  
 CYLLETRON Thoms.  
 122 nivale Thoms. Fvl., 85.  
 PORRHODITES Kraatz.  
 123 fenestralis Zett. Fvl. l. c.  
 ARPEDIUM Er.  
 124 a. quadratum Grav. Fvl., 86 (2).  
 β. alpinum Fvl., 87.  
 125 troglodytes Kiesw. Fvl., 88.  
 126 brachypterum Grav. Fvl. Fn., 188; *Suppl.*, 10.  
 127 Gyllenhali Zett. Fvl. Fn., 89;  
*Suppl.*, 10.  
 ACIDOTA Steph.  
 128 crenata Fabr. Fvl., 89.
- 129 cruentata Mann. Fvl. Fn. 89;  
*Suppl.*, 11.  
 130 quadrata Zett. Fvl. Fn., 89;  
*Suppl.*, 11 (3).  
 AMPHICHROUM Kraatz.  
 131 canaliculatum Er. Fvl., 91.  
 132 hirtellum Heer. Fvl. l. c. (4).  
 LATHRIMÆUM Er.  
 133 melanocephalum Ill. Fvl., 92 (5).  
 134 unicolor Marsh. Fvl., 93.  
 135 atrocephalum Gyll. Fvl., 94.  
 136 fuscum Er. Fvl. l. c.  
 DELIPHRUM Er.  
 137 tectum Payk. Fvl., 95.  
 138 algidum Er. Fvl., 96.  
 139 crenatum Grav. Fvl. Fn., 96;  
*Suppl.*, 11 (6).  
 OLOPHRUM Er.  
 Lathrium Lec.  
 140 piceum Gyll. Fvl., 97 (7).

(1) †119 a. \*laticolle Mots. *Bull. Mosc.*, 1860, II, 549. — Sibérie orient. (*Genus dub.*, forté Arpedium).  
 (2) 123 a. libanicum\*.

♀ Ab omnibus maxime distinctum, statura *quadro* subsimile, sed majus, nitidius, alter punctatum, antice *latius*; nigro subæneum, femoribus totis elytrisque vix apice nigro-piceis, antennis circa apicem tibiis tarsisque rufulis; antennis gracilibus, articulis multo magis quam in *quadro* elongatis; capite multo majore, quasi ut in *Lathrim. melanocephalo* impresso, utrinque dense subtiliter punctato, thorace amplio, transverso, sat dense parum fortiter punctato, lateribus antice multo magis quam in *quadro* ampliatis, antice magis rotundatis, postice magis angustatis, disco longitudinaliter sulcato; scutello punctato; elytris amplis, subconvexis, thorace plus quam dimidio longioribus, punctura dimidio densiore subtilioreque, in series vix apice confusas disposita, intervallis subelevatis; abdominis segmentis duobus elytra tantum excedentibus; ♂ latet. — L., 5 mill.

Liban, Djebel-Zebdani (*de la Brûlerie*).

- † 124 a. \*sibiricum Mann. *Brach.*, 52. — Er. Gen., 860. — Sibérie.  
 † 124 b. \*limbatum Gebler. *Bull. Mosc.*, 1848, III, 80. — Sibérie.  
 (3) † 130 a. \*baicalensis Mots. *Bull. Mosc.*, 1860, II, 549. — Sibérie orient.  
 (4) † 132 a. \*ruficeps Mots. l. c. 547. — Sibérie orient.  
 (5) † 133 a. \*prolongatum Rott. *Berl. Ent. Zeit.*, 1873, 203. — Silesie.  
 † 133 b. \*fratellum Rott. l. c., 1874, 330. — Grèce.  
 † 133 c. \*macrocephalum Eppelsh. *Stett. Ent. Zeit.*, 1873, 86. — Tyrol.  
 (6) 139 a. arcticum\* Er. Gen., 873. — Laponie, ? Tyrol.  
 (7) † 140 a. \*nigropiceum Mots. *Schrenck. Reis.*, 1860, 119, pl. 8, fig. 40. — Kamtschatka.

- 141 fuscum Grav. Fvl., 98 (1).  
 142 assimile Payk. Fvl. l. c.  
 143 alpinum Heer. Fvl., 99.  
 144 consimile Gyll. Fvl. Fn., 99;  
*Suppl.*, 11 (2).  
 OROCHARES Kraatz.  
 145 angustata Er. Fvl., 100.  
 LESTEVA Latr.  
 Phloeopterus Mots.  
 146 pubescens Mann. Fvl., 101.  
 147 fontinalis Kiesw. Fvl., 102.  
 148 Pandellei Fvl., 103 (3).  
 †149 nigra Kr. Fvl., 104.  
 150 luctuosa Fvl., 103 (4).  
 151 corsica Perris. Fvl. l. c.  
 152 longelytrata Goetze. Fvl., 104 (5).  
 153 monticola Kiesw. Fvl., 105.  
 154 punctata Er. Fvl. Fn., 105;  
*Suppl.*, 12 (6).  
 155 Heeri Fvl., 106.  
 GEODROMICUS Redtenb.  
 Geobius Heer. — Geodromus Heer.  
 156 a. suturalis Lac. Fvl., 107.  
 β. nigrita Müll. Fvl., 108.  
 γ. plagiatus Fabr. Fvl. l. c.  
 141 a. caucasicum\*. Magnitudine et statuta *Ol. fuscii*, obscurius rufo-piceum, antennis præter articulum primum, thoracis disco vix, abdomenque præter apicem fuscis, thoracis lateribus obscure dilutis, punctura capitis thoracisque dimidio quam in *fusco* fortiore sparsioreque, hoc breviore, basi magis angustato, disco *Inequali*, per plagas subumbonatas læviore, angulis posticis obtusioribus, elytris circa latera et apicem crebrius punctatis. — L., 4 1/2 mill.  
 Caucase (*de Chaudoir, Gotsch*).  
 Obs. — C'est cet insecte que Hochhuth (*Bull. Mosc.*, 1849, I, 203), indique à tort sous le nom d'*Ol. piceum*.  
 (2) 144 a. rotundicollis\* Sahib. *Ins. Fenn.*, I, 281. — Er. Gen., 866. — Laponie, Finlande, Lithuaniae.  
 144 b. boreale\* Payk. *Mon. Curc. App.*, 146. — Er. Gen., 866 et syn. — Laponie.  
 (3) 148 a. cordicollis\* Mots. *Bull. Mosc.*, 1860, II, 549. — Hochh. l. c., 1862, III, 102. — Daourie, Baikal.

- (4) † 150 a. \*maura Er. Gen., 856. — Sardaigne.  
 (5) † 152 a. \*longula Mann. *Brach.*, 57. — Er. Gen., 857. — Finelande mér. (*Spec. dub.*).  
 (6) 154 a. sicula Er. Gen., 857. — Sicile.  
 (7) 156 a. brevicollis Fvl. — Kunzei Hochh.\* *Bull. Mosc.*, 1849, I, 202 (nec Heer). — Caucase.

## Groupe 5.

- 165 spectabilis Heer. Fvl., 118 (1).  
 166 bicornis Block. Fvl. l. c.  
 167 aeneicollis Fvl. Suppl., 13.  
 168 forticornis Kiesw. Fvl., 118.  
 †169 apenninus Baudi, Fvl., 119.

## TRIBU V. — OXYTELINI Kraatz.

## SECTION I. — OXYTELI Lec.

- DELEASTER Er.  
 176 dichrous Grav. Fvl., 126.  
 ACROGNATHUS Er.  
 Elonium Leach.  
 177 mandibularis Gyll. Fvl., 127.  
 PLANEUSTOMUS Jacq. Duv.  
 Compsochilus Kraatz.  
 178 Kohri Kr. Fvl., 128 (3).  
 179 palpalis Er. Fvl. l. c.  
 180 flavicollis Fvl., 129 (4).

- 170 muticus Kiesw. Fvl., 120.  
 171 pyrenaeus Ch. Bris. Fvl. l. c.  
 172 alpinus Payk. Fvl., 121.  
 173 sudeticus Kiesw. Fvl. l. c.  
 174 fallax Kiesw. Fvl., 122.  
 175 homalinus Zett. Fvl., 123 (2).

## COPROPHILUS Latr.

## Zonoptilus Mots. Solsky.

## Groupe 1 (Coprophilus gen.).

- 181 striatus Fabr. Fvl., 130 (5).  
 SYNTOMIUM Curtis.  
 182 aeneum Müll. Fvl., 131.  
 PHOLIDUS Muls et Rey.  
 Euphanias Fairm.  
 183 insignis Muls. et Rey, Fvl. 132.  
 ACTOCHARIS Fauv.  
 184 marina Fvl., 133.

## THINOBIUS Kiesw.

## Groupe 1.

- †185 major Kraatz, Fvl., 135.  
 186 linearis Kr. Fvl. l. c. (1).  
 brevicollis Muls et Rey.  
 187 delicatulus Kr. Fvl. Fn., 136;  
 Suppl., 14.  
 188 Ligeris Pyot, Fvl., Suppl., 31.  
 189 micros Fvl., 137.  
 190 nitens Fvl. l. c.

## Groupe 2.

- 191 longipennis Heer. Fvl., 138.  
 †192 pusillus Heer. Fvl. l. c.  
 (Sp. dub.).  
 193 brevipennis Kiesw. Fvl., 139.  
 194 atomus Fvl. l. c.  
 195 minutissimus Fvl. Suppl., 14.

## ANCYROPHORUS Kraatz.

## Ochthephilus Muls et Rey.

- Groupe 1.  
 196 emarginatus Fvl., 141.

## Groupe 2.

- \* 197 angustatus Er. Fvl., 142 (2).  
 \*\*  
 198 longipennis Fairm. Fvl., 141 (3).  
 199 aureus Fvl., 142.  
 200 homalinus Er. Fvl. Fn., 143;  
 Suppl., 15 (4).

## Groupe 3.

- 201 flexuosus Fairm. Fvl., 144.

## TROGOPHLOEUS Mann.

Tenosoma Mann. — Carpalius Steph.  
 — Teropalpus Sol. — Thinodromus r.

## Groupe 1 (Thinodromus Kr.).

- 202 dilatatus Er. Fvl., 146.

## Groupe 2.

- \* 203 distinctus Fairm. Fvl., 147.  
 204 plagiatus Kiesw. Fvl. l. c. (5).  
 205 arcuatus Steph. Fvl., 148.

- (1) † 165 a. \*picipennis Gredl. Corresp. Bl. Zool. Ver. Regensb., 1863, XVII, 166.  
 — Redt., Fn. Austr. ed. 3, 265. — Tyrol.  
 (2) † 175 a. \*arpardinus Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 201. — Caucase.  
 (3) 177 a. cephalotes\* Er., Gen. 817. — miles\* Scriba, Berl. Ent. Zeit., 1868, 458.  
 — Mars., L'Abelie, 1871, VIII, 382. — Toscane, Grèce, Algérie.  
 177 b. africanus\* Fairm. Ann. Ent. Fr., 1860, 338. — Constantine, Bône.  
 178 a. \*macellus Kraatz, Heyd. Reis. Span., 1870, 85. — Mars. l. c., 384. — Séville.  
 178 b. curtipennis\* Fvl. Mem. Soc. Linn. Norm., 1869, XV, 43. — Mars. l. c., 383. — Algérie.  
 (4) 180 a. elegantulus\* Kraatz, Nat., 896. — Candie.  
 (5) 181 a. \*piceus Solsky, Hor. Ent. Ross., 1866, IV, 88. — \*Schuberti Mots., Schrenck Reise, 1860, 120 (versim. ex Mots.). — Sarepta, Russie mér.  
 181 b. pennifer Mots. Bull. Mosc., 1845, I, 39; 1857, IV, 503; 1858, III, pl. 4, fig. b. — Hochh. l. c., 1862, III, 99. — Mars., L'Abelie, 1867, IV, 180 (nec Solsky). — Tiflis, Perse mér.  
 181 c. sellula Kraatz. Nat., 894. — Solsky, l. c., 87. — Mésopotamie, Perse.  
 181 d. lateralis\* Fvl. — pennifer\* Solsky, l. c., 86; Expl. Turkest., 1874, II, V, 206 (nec Mots.). — Crimée, Boukharie, Sibérie orientale.

(1) † 186 a. \*brunneipennis Kr. Nat., 884. — Thuringe.

(2) 196 a. filum\*

Magnitudine Trog. corticini, statura et colore Ancyr. angustato vicinus, sed triplo minor, multo angustior, nitidior, piceus, ore, antennis, elytris pedibusque testaceis his circa scutellum infuscatis, antennis multo brevioribus, articulo 3<sup>o</sup> pyriformi, 4-6 parvis, moniliformibus, 7-10 latioribus, transversis, ultimo oblongo; punctura elytrorum dimidio quam in angustato fortiore sparsioreque, capitis, thoracis et abdominis conspicua, licet subtili sparsaque; thorace angulis presertim posticis magis rotundatis, elytris brevibus, hoc tertia parte vix longioribus. — L., 243 mill. Portugal, Coimbra (d'Oliveira).

*Obs.* — Cette espèce est remarquable; je n'en ai vu que deux exemplaires, l'un envoyé sans nom par notre zélé collègue, M. d'Oliveira; l'autre communiqué par M. Skalitsky.

(3) † 197 a. \*Rosenhaueri Kiesw. Stett. Ent. Zeit., 1850, 220. — Kraatz, Nat., 887. — Tyrol.

(4) † 200 a. \*forticornis Mots., Bull. Mosc., 1860, II, 553. — Hochh. l. c., 1862, III, 97. — Daourie.

† 200 b. \*sericinus Solsky, Expl. Turkest., 1874, II, V, 206. — Turkestan, Khokand.

(5) 204 a. transversalis\* Woll., Cat. Mad. Col., 1857, 202; Cat. Can. Col., 1864, 598; Col. Alt., 1865, 518; Col. Hesp., 1867, 255. — Madère, Canaries, Cap Vert, Algérie, Perse mér.

† 204 b. \*Kiesenwetteri Hochh. Bull. Mosc., 1854, III, 55. — Tiflis.

† 204 c. Motschulskyi\* Hochh. l. c., 1860, II, 553; 1862, III, 93. — Tiflis.

† 204 d. \*Mannerheimi Kol. Melet. Ent., III, 26, pl. 12, fig. 2. — scrobiculatus var. Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 193. — Caucase.

## STAPHYLINIDAE. — OXYTELINI.

\*\*  
†206 spinicollis Rye. Fvl. l. c.

Groupe 3 (*Trogophlaeus* gen. — *Tenosoma* Mann. — *Carpalimus* Steph. — *Teropalpus* Sol.).

207 bilineatus Steph. Fvl. Fn., 149; Suppl., 32.

208 rivularis Mots. Fvl. Suppl., 15. Erichson's Sharp. Fvl., 150 (4).

209 anthracinus Muls. et Rey. Fvl. l. c.

210 insularis Kr. Fvl. l. c.

211 memnonius Er. Fvl. Fn., 151; Suppl., 15.

212 fuliginosus Grav. Fvl., 152.

213 politus Kiesw. Fvl. l. c.

214 impressus Lac. Fvl., 153.

215 corticinus Grav. Fvl. l. c.

216 niloticus Er. Fvl. l. c.

217 elongatus Er. Fvl. Fn., 154; Suppl., 16.

218 nitidus Baudi. Fvl., 155.

219 punctatellus Er. Fvl. l. c.

220 foveolatus Sahib. Fvl., 156 (2).

221 punctipennis Kiesw. Fvl. l. c.

222 despiciens Baudi Fvl., 157.

223 exiguus Er. Fvl. Fn., 157; Suppl., 16.

224 halophilus Kiesw. Fvl., 158.

225 pusillus Grav. Fvl., 159.

226 parvulus Muls. et Rey. Fvl. l. c.

227 tenellus Er. Fvl., 160 (3).

228 subtilis Er. Fvl. l. c.

## HAPLODERUS Steph.

*Phleonæus* Er.

229 cælatus Grav. Fvl., 161.

230 cæsus Er. Fvl., 162.

## OXYTELUS Grav.

*Caccoporus*. — *Epomotylus*. — *Tany-*  
*crærus*. — *Anotylus* Thoms.

Groupe 1 (*Oxytelus* gen.).

231 rugosus Fabr. Fvl., 165 (4).

†232 Eppelsheimi Bethe, Fvl. Fn., 165; Suppl., 16 (5).

233 insecatus Grav. Fvl., 166.

Groupe 2 (*Caccoporus*. — *Epomotylus*. — *Tanycrærus*. — *Anotylus* Thoms.).

\*

234 fulvipes Er. Fvl., 167.

235 laqueatus Marsh. Fvl. Fn., 167; Suppl., 32.

236 piceus Linn. Fvl., 168 (6). sulcatus Gebler.

237 sculptus Grav. Fvl., 169.

238 Perrisi Fvl. Fn., 169; Suppl., 17.

239 inustus Grav. Fvl., 170 (7).

maxillosus Sperk.

240 plagiatus Rosh. Fvl. l. c. (nec Mots.).

## STAPHYLINIDAE. — OXYTELINI.

241 sculpturatus Grav. Fvl. Fn., 171; Suppl., 17 (4). montivagus Heer.

242 nitidulus Grav. Fvl. l. c.; Suppl., 17.

\*\*

243 intricatus Er. Fvl. Fn., 172; Suppl., 17.

244 complanatus Er. Fvl., 172.

245 pumilus Er. Fvl., 173.

246 speculifrons Kr. Fvl. l. c.; Suppl., 17.

247 clypeolens Pand. Fvl., 174; Suppl., 17.

248 Sauleyi Pand. Fvl., 175.

249 Fairmairei Pand. Fvl. l. c.

250 tetracarinatus Block. Fvl., 176.

251 hamatus Fairm. Fvl. l. c.

†252 affinis Czwal. Fvl. l. c. (4).

253 tetratoma Czwal. Fvl., 177 (2).

PLATYSTETHUS Männ.

*Pyctocrærus* Thoms.

Groupe 1 (*Pyctocrærus* Thoms.).

254 arenarius Fourc. Fvl., 179 (3).

255 lœvis Kiesw. Fvl., 180.

Groupe 2 (*Platystethus* gen.).

256  $\alpha.$  cornutus Gyll. Fvl., 181.  
 $\beta.$  alutaceus Thoms. Fvl. l. c.

257 spinosus Er. Fvl., 182.

258 capito Heer. Fvl. l. c.

259 nodifrons\* Sahib. Fvl., 183.

260 Burlei Ch. Bris. Fvl., 184.

261 brevipennis Baudi. Fvl. l. c. (4).

(1) + 208 a. \*caucasicus Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 194. — Caucase.

(2) 220 a. \*trogloides\* Er., Gen., 810. — Sardaigne, Sicile, Chypre, Algérie, Syrie  
(an var. *foveolati*?).

220 b. *ruficollis\** Woll. Cat. Canar., 1864, 601. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII,  
375. — *pauper\** Kiesw. in litt. — Madbre, Ténériffe, Mogador, Carthagène, Algérie,  
Egypte.

(3) + 227 a. \*gracilis Mann., Brach., 51. — Europe bor. (? *tenellus* Er., ex Seidlitz?).

(4) 230 a. *opacus\** Kraatz, Nat., 851. — Vienne, Sarepta.

(5) 232 a. *striatrons\** Hochh., Bull. Mosc., 1849, I, 187. — Caucase.

(6) + 236 a. \*mamilatus Hochh., l. c., 1851, III, 33. — Daourie.

+ 236 b. \*clypeatus Mots.; Schrenck Reise, 1860, 119, pl. 8, fig. 12. — Iles Behring, Sibérie orient. (picei var?).

(7) + 239 a. \*politus Er., Gen., 794. — Kraatz, Nat., 859. — Autriche (Sp. dub., forté *inustus*  $\Omega$  minor elytris fuscis).

+ 239 b. \*excavatus Mots., Bull. Mosc., 1857, IV, 503. — Algérie (Sp. dub. — an *Platyst. oxytelinus*?).

(4) 241 a. *brevipennis* Fvl. Mém. Soc. Linn. Norm., 1869, XV, 42. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 370. — Algérie, Tanger.

+ 241 b. \*borealis Mots., Schrenck Reise, 1860, 119, pl. 8, fig. 11. — Sibérie orientale (*nitidulus* var?).

+ 241 c. \*pallipennis Grimmer. Steierm. Col., 1841, 33. — Styrie (Spec. dub.).

(2) 253 a. *sulcifrons\**.

Magnitudine formaque *tetratoma* affinis, sed antennis articulo 8° minuto, capite coriaceo, nec rugosulo, antice lateribusque intra oculos marginato relevatoque, profunde sulcis duobus parallelis a basi ad apicem frontis, alteroque in vertice breviore, sed profundo, impresso, thorace tantum coriaceo, sulculo medio a basi ad apicem aequali, multo magis impresso, carinis multo magis elevatis, lateribus magis fossulatis, quasi punctulatis, angulis posticis minus rotundatis, elytris brevioribus, punctura minus rugosula, abdominis multo subtiliore et densiore. — L., 1  $\frac{1}{4}$  mill.

Syrie, El-Ghor (*de la Brûlerie, Coye*).

(3) 254 a. *oxytelinus\**.

In genere insignis, a *Pl. lavi* punctura maxime distinctus, *Oxytel. inusto* facie sub-similis, ab *arenario* omnino differt corpore angustiore, longiore, nitidiore, magis convexo, capite angustiore, subrotundato, fronte ♂ ♀ non impressa, integra, convexa, nitidissima, lœvi, vertice non sulcato, thorace obsolete breviter sulcato, fortius punctato, subinæquali, antice multo minus augustato, angulis anticus acutis, elytris angustis, parallelis, thorace tertia parte longioribus, abdomineque nitidis, pedibus piceis; ♂ capite majore, latiore, thorace latiore breviorque, abdominis segmentis 6-7 medio profunde impressis, ♂ triangulariter, apice emarginato relevato, 7° bisinuato. — L., 2  $\frac{1}{2}$  mill.

Alger, Médéah (*Lethierry*).

*Obs.* Serait-ce l'*Oxytelus excavatus*, décrit ainsi par Motschulsky : « Très-voisin d'*inustus*, mais un peu plus petit et distinct par l'excavation longitudinale profonde du dernier segment de l'abdomen chez le ♂ » ? — Quelle calamité pour la science que de pareils travaux !

(4) + 261 a. \*Wanckowiczii Hochh., Bull. Mosc., 1871, III, 162. — Kiew.

## STAPHYLINIDAE. — OXYTELINI.

262 *rufospinus* Hochh. Fvl. l. c. (4).  
263 *nitens* Sahlb. Fvl. l. c. (2).

BLEDIUS Mann.

*Astylops* Thoms. — *Bargus* Schiædt. — *Hesperophilus* Steph. — *Tadonus* Schiædt.

Groupe 1 (*Bledius* gen.).

264 *bos* Fvl., 190 (3).

- |   |   |
|---|---|
| 265 <i>taurus</i> Germ. Fvl. Fn., 190;<br><i>Suppl.</i> , 18 (4). | 266 <i>bicornis</i> Germ. Fvl. Fn., 191;<br><i>Suppl.</i> , 19 (5). |
| 267 <i>unicornis</i> Germ. Fvl. Fn., 192;<br><i>Suppl.</i> , 19.  | 268 <i>corniger</i> Rosh. Fvl., 192.                                |
| 269 <i>tricornis</i> Herbst. Fvl., 193.                           | 270 <i>Graellsii</i> Fvl., 194.                                     |
| 271 <i>spectabilis</i> Kr. Fvl., 195.                             |   |

(1) 262 a. *strigosulus*\*.

Magnitudine et facie *rufospinus* subsimilis, corpore medio angustiore, capite thoraceque parcus punctatis, elytris nitidis, adhuc brevioribus, angustioribus, inter puncturam sparsiorum fortiorum subtilius parce strigosulis, abdomen fortius coriaceo, ♂ capite spinis longioribus instructo, post oculos trisulcato, thorace disco antico utrinque transversim subimpresso; segmento 7<sup>o</sup> apice vix dentato, impressione medio apice levigata, non carinata. — L., 2 mill.

Syrie, Jaffa (*de la Brûlerie*).

(2) † 263 \**debilis* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1871, III, 461. — Kiew.

(3) 264 a. *hadus*\* Baudi, *Berl. Ent. Zeit.*, 1857, 410. — Chypre, Egypte, Tunisie.

(4) 265 a. *capra*.

♂ *Cornubus* frontalibus *tauro* affinis, sed his non subangulatis et cæteris maxime diversus; parum nitidus, rufus, capite præter clypeum et cornua, scutelloque nigricantibus, elytris tarsisque testaceis; capite minore quam in *tauro*, thorace multo angustiore longioreque, subtilius parcus punctato, cornu graciliore, angulis anticis truncatis, non proeminibus, lateribus magis post medium angulatis, elytris magis opacis, brevius pubescens, multo subtilius densius punctulatis, infra scutellum piceis, abdomine vix piloso, segmentis circa margines lineatim transverse piceolis; ♀ colore, cornubus minoribus non dilatatis, capite nitidulo, thorace longiore, elytrorum punctura pubescens maxime a *tauro* ♀ distincta. — L., 6 mill.

Egypte, Port-Said (*de la Brûlerie*).

265 b. *vittulus*\* Er. Gen., 761. — *januvianus*\* Woll., *Cat. Canar.*, 1864, 593. — Arabie, Chypre, Sahara, Sénégal, Canaries.

† 265 c. *obscurus* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 556. — Hochh. l. c., 1862, III, 85. — Steppes des Kirghises, Mongolie.

(5) + 266 a. *dicta* Schiædt., *Nat. Tiddsk.*, 1866, 146. — Danemark.

+ 266 b. *\*hinnulus* Er. Gen., 762. — Russie mér., Géorgie, Boukharie.

+ 266 c. *\*juvencus* Er. l. c., 763. — Russie méridionale.

266 d. *carinicollis*\*.

♂ Frontis cornubus *bicorni* affinis, sed his rectioribus latioribusque, apice recte truncatis, thoracis apice supra capitum basi angulatum prolongato, medio carina minuta breviter carinato, inde profundius longitudinaliter sulcate insignis; rufo-piceus, subnitidus, capite infuscato, abdomen præter apicem nigro, pedibus elytris obsecre rufis; *bicornis* minimis exemplaribus æqualis, medio magis angustatus; capite cornuum basi magis transversim impresso, thorace subquadrato, antice lateribusque dense fortiter, ut in *tricorni* punctato-coriaceo, disco basique dense subtilius punctulato, minus opaco; angulis omnibus rotundatis; elytris dimidio quam in *bicorni* minoribus, thorace angustioribus, paulo brevioribus, a basi ad apicem dilatatis, minus fortiter sat dense punctatis, minime coriaceis, apice profunde emarginatis; pedibus anticis maxime validis; ♀ cornubus minoribus, thorace

## STAPHYLINIDAE. — OXYTELINI.

Groupe 2 (*Hesperophilus* Steph.).

- \*
- 272 *verres* Er. Fvl. Fn., 196; *Suppl.*, 33 (4).
- 273 *angustus* Muls. et Rey. Fvl. l. c. (2).
- \*\*
- 274 *fossor* Heer. Fvl., 197 (3).
- \*\*\*
- 275 *arenarius* Payk. Fvl. l. c. (4).
- 276 *debilis* Er. Fvl. l. c.
- 277 *tristis* Aubé Fvl., 198.

Groupe 3 (*Astylops* Th. — *Bargus* Schiædt. — *Tadonus* Schiædt.).

- \*
- 278 *tibialis* Heer. Fvl. 199.
- 279 *hispidulus* Fairm. Fvl. l. c.
- \*\*
- 280 *talpa* Gyll. Fvl., 200.
- 281 *subterraneus* Er. Fvl. Fn., 200; *Suppl.*, 34.

282 *pallipes* Grav. Fvl. Fn., 201; *Suppl.*, 34.

283 *denticollis* Fvl., 202.

284 *erraticus* Er. Fvl., 203.

285 *atricapillus* Germ. Fvl. l. c.

286 *opacus* Block. Fvl., 204.

287 *littoralis* Heer. Fvl. l. c.

288 *Baudii* Fvl., 205.

289 *pygmaeus* Er. Fvl. l. c.

290 *pusillus* Er. Fvl., 206.

291 *obsoletus* Fvl., 207.

292 *longulus* Er. Fvl. l. c. (5).

293 *crassicollis* Lac. Fvl., 208 (6).

294 *procerulus* Er. Fvl. l. c.

295 *cribricollis* Heer. Fvl., 209.

296 *dissimilis* Er. Fvl., 210 (7).

297 *fracticornis* Payk. Fvl. l. c.

298 *femoralis* Gyll. Fvl., 211.

299 *strictus* Fvl. l. c.

300 *defensus* Fvl., 212; *Suppl.*, 35.

## SECTION II. — OSORII Er.

## CYLINDROGASTER Fauv. (8).

301 *corsicus* Fvl., 213.

antice mutico, recte truncato, lateribus antice parum angustatis. — L., 5 1/2 mill. Biskra (*Lethierry*).

† 266 e. *diffinis*\* Baudi, *Berl. Ent. Zeit.*, 1869, 398. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 362. — Chypre.

(1) + 272 a. *\*affinis* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 556. — Hochh. l. c., 1862, III, 87. — Volga, Kirghises (an verres var?).

272 b. *niloticus*\* Er. Gen., 776. — Sahara, Egypte, Syrie.

(2) 273 a. *infans*\* Rottenb., *Berl. Ent. Zeit.*, 1870, 36. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 366. — Sicile.

(3) + 274 a. *\*grandicollis*\* Mots., *Bull. Mosc.*, 1857, IV, 507. — Styrie (fossor var?).  
+ 274 b. *\*limbatus* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1871, III, 158. — Kiew.

(4) + 275 a. *\*cordicollis*\* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 555. — Hochh. l. c., 1862, III, 90. — Baikal, Daourie (*arenarius* var?).

(5) + 292 a. *\*erythropterus* Kraatz, *Nat.*, 831. — Alpes bavaroises.

(6) + 293 a. *\*picipennis* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1849, I, 182. — Caucase.

(7) + 296 a. *nigricans* Er. Gen., 769. — Russie mér. (dissimilis var?).

296 b. *atratus*\*

Magnitudine *talpa* equalis, inter omnes capite opacissimo, subtilissime coriaceo, deplanato, impunctato insignis, forma puncturaque *fracticorni* affinis, nitidulus, niger, mandibulis apice, antennis articulo primo basi, tibiisque rufescensibus, tarsis testaceis; thorace robustiore, longiore quam in *fracticorni*, lateribus circa basim minus rotundatis, subangulatis, elytris hoc vix longioribus, subquadратis. — L., 5-5 1/2 mill.

Sardaigne, Tertenia, en avril (*Gestro*, coll. Doria).

(8) Avant ce genre, se place le suivant :

## OSORIUS Latr.

Régn. Anim., 1829, IV, 438.

*Molosoma* Say.

300 a. *syriacus*\* Fvl., Ann. Ent. Fr., 1875, Bull., 8. — Egypte, Port-Said.

- SECTION III. — **OXYPORI** Lec.  
OXYPORUS Fabr.  
302 rufus Linn. Fvl., 215 (4).
- 303 Mannerheimi Gyll. Fvl. l. c.  
304 maxillosus Fabr. Fvl., 216.

## TRIBU VI. — STENINI Kraatz.

SECTION I. — **EVÆSTHETI** Lec.

EDAPHUS Lec.  
†305 dissimilis Aubé. Fvl., 219.

OCTAVIUS Fauv.  
\*

306 pyrenaeus Fvl., 220.  
\*\*

307 insularis Fvl. l. c.  
†308 crenicollis Fvl. Suppl., 55.  
\*\*\*  
†309 \*grandiceps Muls. et Rey. Fvl., 220 (*Gen. dub.*).

EVÆSTHETUS Grav.  
Eristhetus Mann.

310 bipunctatus Ljung. Fvl., 222 (2).  
311 ruficapillus Lac. Fvl., 223.  
312 lœviusculus Mann. Fvl., 224.

MAYETIA Muls. et Rey.  
†313 sphærifer\* Muls. et Rey. Fvl.  
Suppl., 56.

SECTION II. — **LEPTOTYPHLI** Fauv.

LEPTOTYPHLUS Fauv.

314 sublævis Fvl. Suppl., 36.

SECTION III. — **STENI** Lec.

## DIANOUS Samouelle.

315 corrulescens Gyll. Fvl., 225.

STENUS Latr.

Hemistenus Mots.

Groupe 1 (*Stenus gen.*).

316 biguttatus Linn. Fvl., 231 (3).  
317 bipunctatus Er. Fvl., 232.  
318 longipes Heer. Fvl., 233.

319 ocellatus Fvl. l. c.

\*\*

320 guttula Müll. Fvl., 234.  
321 lævigatus Muls. et Rey. Fvl.  
l. c. (4).

\*\*\*

322 aterrimus Er. Fvl., 235.  
323 subfuscatus Fairm. Fvl. l. c.

\*\*\*\*

324 alpicola Fvl., 236.

\*\*\*\*\*

325 asphaltinus Er. Fvl. l. c. (5).  
326 Guynemer Jacq. Duv. Fvl., 237.  
327 fossulatus Er. Fvl., 238.  
328 gracilipes Kraatz. Fvl. l. c. (6).  
329 oreophilus Fairm. et Ch. Bris.  
Fvl. l. c.

(1) 301 a. *Dybowski*\* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 242. — Sibérie, Baïkal.

(2) † 310 a. \*elongatus Mots., Bull. Mosc., 1860, II, 337. — Baïkal (*Sp. dub.*).

(3) 315 a. *aereus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 163. — Asie centrale, Syrie.

(4) + 321 a. \*bipustulatus Thoms., Oef. Vet. Ak. Forh., 1857, 220; Skand. Col., II, 228. — Suède.

(5) † 325 a. \*Monticellii Costa, Act. Ac. Sc. Neap., 1839, IV, 59, pl. 2, fig. 4. — Italie mér. (*Sp. max. dub.*).

(6) † 328 a. \*bilineatus J. Sahib., Not. Faun. Fl. Fenn., XI, 1870, 412. — *inæqualis* Mann, in litt. — Laponie (*gracilipes var?*).

330 incanus Er. Fvl., 239.

331 strigosus Fvl. l. c.

332 nanus Steph. Fvl., 240 (1).

## Groupe 2.

\*

333 stigmula Er. Fvl. l. c.

334 bimaculatus Gyll. Fvl., 241;  
Suppl., 37.

\*\*

335 clavicornis Scop. Fvl., 242.

336 scrutator Er. Fvl. l. c.

337 providus Er. Fvl. Fn., 243;  
Suppl., 22.

338 lustrator Er. Fvl., 244.

339 sylvester Er. Fvl. l. c.; Suppl.,  
37 (2).

340 proditor Er. Fvl. l. c. (3).

\*\*\*

341 calcaratus Scrib. Fvl., 245.

342 Juno Fabr. Fvl., 246.

343 ater Mann. Fvl., 247 (4).

344 longitarsis Thoms. Fvl. l. c.

345 intricatus Er. Fvl., 248 (5).

346 affaber Baudi. Fvl. l. c. (6).

347 gallicus Fvl. l. c.

\*\*\*\*

348 circularis Grav. Fvl., 249 (7).

349 pumilio Er. Fvl. l. c. (nec  
Thoms.).

350 pusillus Steph. Fvl., 250.

351 exiguum Er. Fvl. l. c.

## Groupe 3.

\*

352 palpus Zett. Fvl. Fn., 251;  
Suppl., 37 (8).

353 ruralis Er. Fvl., 252.

354 incrassatus Er. Fvl. l. c.

355 umbricus Baudi. Fvl. l. c.

356 bupthalmus Grav. Fvl., 253.

357 melanarius Steph. Fvl., 254 (9).

358 explorator Fvl. l. c.

359 canaliculatus Gyll. Fvl., 255.

\*\*

360 nitens Steph. Fvl. l. c.

361 melanopus Marsh. Fvl., 256 (10).

+ 362 foraminosus Er. Fvl., 257.

363 atratulus Er. Fvl., 256 (11).

+ 364 subdepressus Muls. et Rey. Fvl.  
l. c. (*Spec. dub.*).

365 morio Grav. Fvl., 257.

(1) + 332 a. \*micros Solsky, Expl. Turkest., 1874, II, V, 496. — Samarkand.  
+ 332 b. \*minutissimus Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 557. — Hochh. l. c., 1862,  
III, 81. — Daourie.

(2) 339 a. hyperboreus\* J. Sahib. — Laponie (*Sp. indesc?*).

+ 339 b. \*kamtschaticus Mots. Bull. Mosc., 1843, IV, 355. — Kamtschatka.

(3) + 340 a. \*excubitor Er. Kœf. Mark., I, 531; Gen., 714. — Kraatz, Nat., 769. —  
Prusse, Autriche.

(4) + 343 a. \*punctipennis Thoms. Skand. Col., II, 214. — Scandinavie.

(5) + 343 a. \*hispanicus Mots. Bull. Mosc., 1849, III, 55. — Espagne (*Sp. dub.*).

(6) 346 a. calidus\* Baudi. Stud. Ent., I, 141. — Chypre, Syrie, Perse mérid.  
346 b. fasciculatus\* J. Sahib. Not. Faun. Fl. Fenn., 1870, XI, 341. — Karélie,  
Baïkal.

346 c. grandiceps Thoms. Oef. Vet. Ak. Forh., 1857, 222; Skand. Col., II, 215.  
— Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1864, 132. — Scanie, Germanie.

346 d. ripicola\* J. Sahib. l. c., 414 (nec Seidl., Fn. Balt., 254). — Laponie,  
Pologne.

(7) + 348 a. \*flavitarsis Mots. Bull. Mosc., 1857, IV, 510. — Egypte.

(8) + 352 a. \*labilis Er. Gen., 697. — Thoms. Skand. Col., II, 223. — Laponie,  
Scandinavie.

(9) + 357 a. \*arctulus Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 474. — Caucase.

(10) 361 a. cordicollis Fvl. Mém. Soc. Linn. Norm., 1869, XV, 40. — Mars.,  
L'Abeille, 1871, VIII, 350. — Algérie.

(11) + 363 a. \*mendicus Er. Gen., 702. — Portugal.  
363 b. piscator\* Sauly, Ann. Ent. Fr., 1864, 655. — morulus\* Baudi, Berl.  
Ent. Zeit., 1869, 395; Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 348, 349. — Chypre, Syrie.

- \*\*\*  
 366 *vafellus* Er. Fvl., 258 (4).  
 367 *macrocephalus* Aubé, Fvl. Fn., 259; *Suppl.*, 38.  
 368 *fuscipes* Grav. Fvl. Fn., 259; *Suppl.*, 38.

*Groupe 4.*

- 369 *crassus* Steph. Fvl., 260.  
 370 *eumerus* Kiesw. Fvl., 261 (2).  
 371 *opicus* Grav. Fvl. l. c. (3).

*Groupe 5.*

- \*  
 372 *Argus* Grav. Fvl., 262.  
 \*\*  
 373 *humilis* Er. Fvl., 263 (4).  
 374 *carbonarius* Gyll. Fvl. l. c. (5).

*Groupe 6.*

- 375 *nigritulus* Gyll. Fvl., 264.  
 376 *brunnipes* Steph. Fvl., 265.

*Groupe 7 (Hemistenus Mots.).*

- 377 *latifrons* Er. Fvl. l. c.

- +378 *oscillator* Rye. Fvl. l. c.  
 379 *paganus* Er. Fvl., 266.  
 380 *tarsalis* Ljung. Fvl., 267.  
 381 *similis* Herbst. Fvl. l. c.  
 382 *solutus* Er. Fvl., 268.  
 383 *cicindeloides* Schall. Fvl. l. c.  
 384 *Kiesenwetteri* Rosh. Fvl., 269.  
 385 *fornicatus* Steph., Fvl. l. c. (6).

*Groupe 8.*

- \*
- 386 *canescens* Rosh. Fvl., 270.  
 387 *pubescens* Steph. Fvl., 271.  
 388 *salinus* Ch. Bris. Fvl. l. c.  
 389 *binotatus* Ljung. Fvl., 272.  
 390 *pallitarsis* Steph. Fvl., 273.  
 391 *niveus* Fvl. l. c.  
 \*\*  
 392 *Leprieuri* Cussac. Fvl., 274.  
 393 *picipes* Steph. Fvl., Fn., 274;  
*Suppl.*, 23.  
 394 *foveicollis* Kr. Fvl., 275 (7).  
 395 *bifoveolatus* Gyll. Fvl. l. c.  
 396 *picipennis* Er. Fvl., 276.  
 397 *languidus* Er. Fvl. l. c.  
 398 *nitidiusculus* Steph. Fvl., 277.  
 399 *flavipes* Steph. Fvl., 278.

*Groupe 9.*

- 400 *cordatus* Grav. Fvl. l. c.  
 401 *hospes* Er. Fvl., 279.  
 402 *politus* Aubé. Fvl. l. c. (1).  
 403 *elegans* Rosh. Fvl., 280.  
 404 *glacialis* Heer. Fvl., 281.  
 405 *subaneus* Er. Fvl. l. c.  
 406 *aerosus* Er. Fvl., 282.  
 407 *impressus* Germ. Fvl., 283.  
 408 *montivagus* Heer. Fvl., 284.

## TRIBU VII. — PÆDERINI Kraatz.

## SECTION I. — PINOPHILI Er.

- PINOPHILUS Grav.  
 Aræocerus Nordm. — LYCIDIUS Leach. —  
 Pityophilus Brullé.

- 420 *ægyptius* Er. Fvl., 290.  
 †421 *siculus* Kraatz. Fvl. l. c.  
 422 *brevicollis* Er. Fvl., 291.  
 423 *longicornis* Baudi. Fvl. l. c.

- PROCIRRUS Er.  
 424 *Lefebvrei* Latr. Fvl. l. c.  
 425 *Saulcyi* Fvl. l. c.

- OEDICHIRUS Er.  
 Elytrobæus Sahbh.  
 \*

- 426 pæderinus Er. Fvl. l. c.

- †427 OEDIPUS Rottenb. Fvl. l. c.

\*\*

- †428 unicolor Aubé. Fvl. l. c.

## SECTION II. — PÆDERI Er.

- CTENOMASTAX Kraatz.  
 †429 Kiesenwetteri Kr. Fvl. l. c.

- SUNIUS Steph.

- Astenus Lac. — MECOGNATHUS Woll. —  
 Neognathus Sharp.  
 \*

- 430 collaris Fvl., 294.  
 431 latus Rosh. Fvl., 293 (4).  
 432 tristis Er. Fvl. Fn., 296.  
 platinotus Saulcy.  
 diversicollis Fvl. (nec Baudi).

- (1) 402 a. *cyanus*\* Baudi, Stud. Ent., I, 442. — Kr. Berl. Ent. Zeit., 1858, 423; 1869, 396 — *splendens*\* Saulcy, Ann. Ent. Fr., 1864, 636. — *rutilans*\* Saulcy, l. c. — Mars. L'Abélie, 1871, VIII, 331. — Grèce, Chypre, Syrie.

- (2) 410 a. *aureolus*\*.

*S. scabro affinis*, tertia parte minor, capite elytrisque minus scabrosis, multo densius, subtilius punctato-rugosus, palpis articulo ultimo infuscato, antennis pedibusque magis rufulis, antennis, articulis 3-7 præsertim, multo brevioribus, capite breviter circa basin carinulato, thorace antice magis angustato, lateribus magis angulato, disco longitudinaliter late profunde sulcato, vix inaequali, elytris angustioribus, thoracis longitudine, parum inaequalibus, abdomine basi subtilius crebreusque, apice multo subtilius dense punctato facilmente distinguendus; ♂ segmento 7º apice angusto profundè triangulariter inciso, 6º sinuato, vix impresso. — L., 3 1/2-3 3/4 mill.

Mydcanka (*Dybouski*).

- (3) + 419 a. *maculipes* Grimmer, Steierm. Col., 1841, 33. — Styrie (Spec. dub.).  
 † 419 b. *brunnipes* Grimm. l. c. — Styrie (Spec. dub.).

- (4) 431 a. *curtulus*\* Er. Gen., 645. — Corse, Sardaigne.

- + 431 b. *lithocharoides* Solsky, Expl. Turkest., 1874, II, V, 189. — Samarkand.

(1) † 366 a. *clarulus* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 174. — Caucase.  
 (2) † 370 a. *dauricus* Mots. l. c., 1860, II, 537. — Hochh. l. c., 1862, III, 82. — Daourie.

368 b. *formicetorum*\* Mann. Bull. Mosc., 1843, I, 83. — *eumerus*\* Seidl. Fn. Ball., 237 (nec Kiesw.). — Russie, Finlande.

(3) + 371 a. *minutus* Hochh. l. c., 1849, I, 176. — Caucase.

(4) 372 a. *rugosulus*\*.

*S. nano paulo major*; *humili* vicinus, sed multo minor, vix pubescens, capitis, thorace elytrorum punctura dimidio fortiore, rugosula, antennis brevioribus, brunneis, articulis duobus primis nigris, palpis rufo-brunneis, fronte profunde bisulcata, intersticio latisculo, convexo, subcarinato, thorace breviore, basi fortius strangulato, postice circa basim sat profunde latius oblique bilimpresso, lateribus subangulato, elytris tertia parte brevioribus, a basi ad apicem magis dilatatis, disco inaequalibus, bilimpresso, abdomine breviore, nitidiore, parce multo subtus punctato maxime distinctus; ♂ latet. — L., 2 mill.

Mydcanka, près du lac Baïkal (*Dybouski*).

(5) † 374 a. *glabellus* Thoms. Opusc. Ent., 1870, II, 127. — Suède.

+ 374 b. *subglaber* Thoms. l. c., 1870, III, 329. — Scanie.

(6) † 385 a. *tumidulus* Solsky, Expl. Turkest., 1874, II, V, 199. — Turkestan, Tachkend.

(7) 394 a. *paludicola*\* Kiesw. Berl. Ent. Zeit., 1858, 124. — *uliginosus* Kiesw. in litt. — Grèce.

- 433 uniformis Jacq. Duv. Fvl.,  
Suppl., 40.  
anguinus Fvl. Fn., 293 (nec  
Baudi).
- 434 filiformis Latr. Fvl. Fn., 295;  
Suppl., 24, 40 (1).  
\*\*
- 435 cibrellus Baudi, Fvl., 294 (2).  
436 pulchellus Heer, Fvl., 295.  
\*\*\*
- 437 bimaculatus Er. Fvl., 296 (3).  
438 melanurus Küst. Fvl. l. c. (4).  
\*\*\*\*
- 439 intermedius Er. Fvl., 297 (5).  
440 gracilis Payk. Fvl., 298 (6).
- NAZERIS Fauvel.  
Mesunius Sharp.
- 441 pulcher Aubé. Fvl., 299.  
†442 Ammonita Saulcy. Fvl. l. c.
- CEPHISUS Fauvel.  
443 Orientis Fvl., 300.  
STILICUS Latr.  
Rugillus Curt.  
Groupe 1.  
\*  
444 subtilis Er. Fvl., 301 (7).  
\*\*
- 445 rufipes Germ. Fvl. Fn., 301;  
Suppl., 40 (8).  
446 Erichsonis Fvl., 302.  
\*\*\*
- 447 similis Er. Fvl. Fn., 302;  
Suppl., 40.  
448 geniculatus Er. Fvl., 303.  
449 orbiculatus Payk. Fvl. l. c.  
450 flavipes Mots. Fvl., 304.  
Groupe 2.  
451 fragilis Germ. Fvl. l. c. (9).

(1) + 434 a. *\*fasciatus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 482; Expl. Turkest., 1874, II, V, 190 (nec Mots. Hochh.). — Turkestan, Boukharie.  
+ 434 b. *fallax*\* Saulcy, Ann. Ent. Fr., 1864, 52. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 338. — Syrie.

(2) 435 c. *filum*\* Aubé, Ann. Ent. Fr., 1850, 317. — *asper*\* Aubé, l. c. — *rutilipennis*\* Chevrol. Rev. Zool., 1860, 410. — Sardaigne, Espagne, Maroc, Algérie.

(3) 436 a. *nigromaculatus*\* Mots. Bull. Mosc., 1858, II, 637. — Woll. Col. Hesper., 1867, 246. — Syrie, Egypte, Algérie, Cap Vert.

(4) + 438 a. *microthorax*\*.  
Magnitudine *intermedii*, sed tertia parte latior; colore *melanurus* similis, capite multo latiore, oculis tertia parte minoribus, antennis articulis longioribus, thorace simili, elytris dimidio angustiore, his amplissimis, hoc paulo longioribus, fortiter parce punctatis, abdomine latissimo, medio dilatato, circa apicem acuminato. — L., 3 1/2 mill.

Sous une pierre, au pied des thérèbinthes. — Algérie, Kef-el-Hameur, dans le Djebel-Bouk-Aïl (R. Oberthür).

Un seul exemplaire.  
(5) + 439 a. *\*dalmatinus* Küster, Kœf. Eur., 26. — Dalmatie (? *intermedius* Er.).  
(6) + 440 a. *Thaboris*\* Saulcy, Ann. Ent. Fr., 1864, 633. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 340. — Syrie.

440 b. *thoracicus*\* Baudi, Berl. Ent. Zeit., 1857, 103. — *subnitidus*\* Kr. l. c., 1858, 66. — Grèce, Chypre, Syrie.

(7) + 444 a. *\*prolongatus* Solsky, Expl. Turkest., 1874, II, V, 487. — Turkestan, Tachkend.

(8) 445 a. *arabs*\* Saulcy, Ann. Ent. Fr., 1864, 634. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 323. — Syrie.

(9) + 451 a. *capitalis*\* Harold, Cat. Col., 617. — Solsky, Expl. Turk., 1874, II, V, 488. — *bimaculatus*\* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 562. — Hochh. l. c., 1862, III, 74. — Steppes des Kirghises, Samarkand.

- 452 festivus Muls. et Rey. Fvl., 305.  
DOMENE Fauvel.  
453 scabricollis Er. Fvl., 306.  
454 stilicina Er. Fvl. l. c. (1).  
†455 scopælla Fvl. l. c.  
SCOPÆUS Er.  
Polyodontus Sol. — Scoponæus Mots.  
Groupe 1 (*Scopaeus* gen.).  
\*  
456 bicolor Baudi. Fvl., 308.  
\*\*  
457 gracilis Sperk. Fvl. l. c.  
458 scitulus Baudi. Fvl., 309.  
459 sericans Muls. et Rey. Fvl., 310.  
460 lavigatus Gyll. Fvl. l. c.  
461 longicollis Fvl. Fn., 311;  
Suppl., 40.  
Groupe 2 (*Polyodontus Sol.* — *Scoponæus* Mots.).  
\*  
462 didymus Er. Fvl. l. c.  
463 minimus Er., Fvl., 312 (2).  
\*\*  
464 rubidus Muls. et Rey. Fvl., 313.  
†465 micropterus Fvl. l. c.  
Groupe 2.  
476 debilicornis Woll. Fvl., 322.  
Groupe 3.  
\*  
477 brunnea Er. Fvl. l. c.  
? ferruginea Er. Kr.

(1) + 454 a. *lithocharina*\*.

*D. stilocinaria* vicina, sed aptera, tota rufa, abdomine rufo-piceo, lateribus apice que, palpis pedibus rufo-testaceis, capite multo majore, maxime oviformi, antice multo magis angustato, paulo minus crebre punctato, oculis dimidio minoribus, antennis crassioribus longioribusque, articulis magis elongatis, thorace antice multo magis attenuato, linea longitudinali leviori, elytris multo minoribus, thorace quarta parte brevioribus, fortius rugose punctatis, abdomine minus nitido, densius puberulo punctulatoque diffinis; ♂ latet. — L., 6 mill.

Province d'Alger.

(2) + 463 a. *\*mutatus* Harold, Cat. Col., 619. — *\*pusillus* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 162. — Arménie.

+ 463 b. *pilicornis*\* Baudi, Berl. Ent. Zeit., 1869, 392. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 327. — Chypre.

(3) + 467 a. *infirmus*\* Er. Gen., 607. — Egypte, Syrie.

(4) + 468 a. *\*oppidana* Kraatz, Nat., 711. — Berlin.

(5) + 471 a. *\*Kellneri* Kraatz, Deut. Ent. Zeit., 1873, 123. — Thuringe.

+ 471 b. *\*spelæa* Scrib. Heyd. Reis. Span., 1870, 82. — Espagne mér., Alcoy.

- 478 pocofera Peyron. Fvl., 323 (1).  
 479 rufiventris Nordm. Fvl. l. c.  
 \*\*  
 480 nigritula Er. Fvl., 324 (2).  
 481 græca Kr. Fvl. l. c.  
 \*\*\*  
 482 propinqua Ch. Bris. Fvl., 325.  
 483 ruficollis Kr. Fvl. l. c.  
 484 melanocephala Fabr. Fvl., 326.  
 \*\*\*\*  
 485 aveyronensis Math. Fvl., 327.  
 486 seminigra Fairm. Fvl. l. c.  
 SCOTONOMUS Fauvel.  
 487 Raymondi Fvl., 328.  
 PÆDERUS Fabr.  
 Pæderomorphus Gaut.  
 \*  
 488 Baudii Fairm. Fvl., 329.
- 489 lusitanicus Aubé, Fvl. l. c.  
 490 brevipennis Lac. Fvl., 330.  
 491 meridionalis Fvl., 331.  
 492 gregarius Scop. Fvl. l. c.  
 493 riparius Linn. Fvl., 332.  
 †494 a. ruficeps Baudi, Fvl. l. c.  
 β. melanurus Arag. Fvl. l. c.  
 495 caligatus Er. Fvl., 333.  
 496 limnophilus Er. Fvl., 334.  
 497 fuscipes Curt. Fvl. l. c.  
 \*\*  
 498 a. sanguinicollis Steph. Fvl., 335.  
 β. ruficollis Fabr. Fvl., 336 (3).
- DOLICAON Casteln.  
 Adelobium Nordm.  
 499 biguttulus Lac. Fvl., 337 (4).

(1) 478 a. *despecta*\* Fairm. Ann. Ent. Fr., 1860, 160. — Algérie.  
 478 b. *semiobscura*\*.

*L. pocofera* vicina, sed tertia parte minor, sat angustior, nigra, capite thorace vix nitidulus, elytris sepius præter maculam scutellarem obscure rufis, ore, antennis, ano pedibusque testaceis, antennis brevioribus, capite multo angustiore, subtilius dense punctulato, quadrato, inter oculos antenнаsque subopaco punctulatoque, disco medio anguste nitido, laevi, angulis posticis magis rotundato, thorace angustiore, subtilius crebriusque punctato, angulis anticis magis oblique rotundatis, linea longitudinali magis obsoleta, elytris vix rugosius crebriusque, abdomen densius subtiliusque, præsertim segmento 6° subopaco, punctato insignis. — L., 4 mill.

Syrie, Wadi-Tzera, Ain-Hammé, Naplouse, Djebel-Cheik, Fahil (*de la Brûlerie*).  
 478 c. *africana*\* Fvl. Mém. Soc. Linn. Norm., 1869, XV, 38. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 329. — Algérie.

478 d. *pythonissa*\* Sauley, Ann. Ent. Fr., 1864, 649. — Mars. l. c. — Syrie.

(2) † 479 a. *\*castanoptera* Kraatz, Nat., 716. — Bavière.

(3) 498 a. *memnonius*\* Er. Gen., 664. — Egypte, Nubie.

(4) Ce genre se divise de la manière suivante:

Groupe 1 (*Dolicaon gen.* — *Adelobium Nordm.*). \*

498 b. *densiventris*\*.

A. *D. cribicollis* punctura thoracis elytrorumque multo minus subtili distinctus; *illyricus* vicinus, sed elytrorum punctura fortior, abdominis fortiori triploque densiore, capite angustiore longioreque, multo densius fortiusque punctato, thorace capite vix latiore, basin versus minus angustato, angulis minus rotundatis, posticis subrectis, elytris paulo minus nitidis, magis rugosulis optime distinguendus; C segmento 7° profundi inciso, incisura parallela; 6° obsolete apice sinuato, medio obsoleti impresso. — L., 8-8 mill.

Tunisie, Kairouan, Utica, en mars et avril (*Kerim*); Bône (*Leprieur*); Constantine (*Hénon*); Milianah (*Lethierry*); Tanger (*Olcese*).

Obs. Les exemplaires de *illyricus* notés de Constantine et de Tanger dans le Catalogue d'Algérie, de M. Reiche (p. 37), se rapportent à cette espèce.

- LATHROBIUM Grav.  
 Glyptomerus Mull. — Typhlobium Kr. — Centrocnemis Joseph.  
 Groupe 1 (*Lathrobium gen.*). \*  
 500 punctatum Fourc. Fvl. Fn., 344;  
 Suppl., 42.  
 luteipes Fvl. Fn., 342.  
 \*\*  
 501 elongatum Linn. Fvl. l. c.  
 502 geminum Kr. Fvl., 343.  
 †503 boreale Hochh. Fvl. l. c. (1).  
 504 castaneipenne Hochh. Fvl., 344.  
 505 fulvipenne Grav. Fvl. Fn., 344;  
 Suppl., 42 (2).  
 506 rufipenne Gyll. Fvl., 345.  
 507 lœvipenne Heer. Fvl., 346.  
 \*\*\*  
 508 suturale Wenck. Fvl. l. c. (3).  
 509 filiforme Grav. Fvl., 347 (4).  
 510 dilutum Er. Fvl., 348 (5).

498 c. *cribricollis*\* Fvl. Mém. Soc. Linn. Norm., 1869, XV, 37. — Mars. *L'Abeille*, 1871, VIII, 324. — Tanger.  
 498 d. *illyricus*\* Er. Gen., 577. — *syriacus*\* Sauley, Ann. Ent. Fr., 1864, 644. — Sicile, Illyrie, Algérie, Chypre, Syrie.

498 e. *melanocephalus*\* Reiche, Ann. Ent. Fr., 1856, 366. — Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1858, 66. — Grèce.  
 498 f. *venustus*\* Baudi, Stud. Ent., I, 134; Berl. Ent. Zeit., 1869, 390. — Kraatz, l. c. (nec Peyron). — Palestine.  
 498 g. *obesus*\*.

Colore *D. melanocephali*, sed major et multo latior, elytris amplis, brevissimis, thorace plus quam dimidio brevioribus, subdeplanatis, punctis aliquot obsoletis impressis, capite multo latiore breviroreque, parce subtilius punctulato, thorace amplissimo, tertia parte latiore, circa basin rotundato, angulis rotundis, punctis raris notato, abdominis segmenti sexti tertia parte apicali septimoque toto rufis maxime distinctus. — L., 6 1/2 mill.

Naplouse, Liban (*de la Brûlerie*).

498 h. *semirufus*\*.

Colore *obesi*, primo visu forma, præsertim thoracis, parallela distinctus; *melanocephalo* minor, punctura capitis, thoracis, elytrorumque omnino alia, sparsa, subtili, abdominis subtiliore parcioreque, antennis gracilioribus, articulo 3° longiore, capite basi magis truncato, thorace circa basin magis angustato, abdominis segmenti sexti dimidia parte apicali septimoque toto rufis. — L., 5 mill.

Damas, Djebel-Cheik (*de la Brûlerie*).

Groupe 2.

- † 498 i. *\*gracilis* Grav. Micr., 182. — Er. Gen., 578 (nec Redt.). — Portugal.  
 498 j. *hemorrhous*\* Er. Gen., 577. — Sicile, Sardaigne, Algérie, Maroc.  
 499 *biguttulus* Lac.  
 + 499 a. *\*pullus* Solsky, Hor. Ent. Ross., 1871, VIII, 161; Expl. Turkest., 1874, II, V, 186. — Samarkand.  
 + 499 b. *\*angusticollis* Hochh. Bull. Mosc., 1851, III, 32. — Arménie.  
 (1) + 503 a. *\*volgense* Hochh. Bull. Mosc., 1851, III, 42. — Kasan.  
 (2) + 505 a. *\*rugipenne* Hochh. l. c., 46. — Arménie.  
 (3) + 507 a. *elegantulum*\* Kraatz, Nat., 680. — Carinthie, Croatie.  
 (4) + 509 a. *\*testaceum* Kr. l. c., 682. — Autriche.  
 (5) 510 a. *sibiricum*\*.  
 Magnitudine *L. diluti*, sed maxime distinctum; parum nitidum, nigro-piceum, capite, ore, antennis, thorace, elytris, pedibus, segmento 6° summo apice, 7° præter basin rufescensibus; capite quadrangulari, elongato, parallelo, thoracis latitudine, parce sat fortiter punctato; thorace convexo, latiusculo, circa basin parum angustato, utrinque parum dense sat fortiter punctato, angulis omnibus fortiter rotundatis, elytris subdepressis, thorace tertia parte brevioribus, a basi ad apicem sat

\*\*\*\*

- 511 dividuum Er. Fvl. l. c.  
512 longulum Grav. Fvl., 349.

## Groupe 2.

- 513 labile Er. Fvl., 350.  
514 multipunctum Grav. Fvl. l. c. (4)

## Groupe 3.

\*

- 515 angustatum Lac. Fvl., 351.  
516 scutellare Nordm. Fvl. l. c.  
\*\*  
517 quadratum Payk. Fvl., 352 (2).  
518 atripalpe Scrib. Fvl. l. c.

## Groupe 4.

- 519 fovulum Steph. Fvl., 354 (3).  
rulipes Mækl. Fvl., Suppl.

- 520 pallidum Nordm. Fvl. l. c. (4).  
521 spadiceum Er. Fvl., 355 (5).

Groupe 5 (*Glyptomerus* Müll. — *Typhlobium* Kr.).

- 522 a. cavicola Müll. Fvl. l. c.  
b. apenninum Baudi. Fvl. l. c.

## Groupe 6.

- 523 bicolor Er. Fvl., 356.  
524 angusticollis Lac. Fvl., 357.  
525 picipes Er. Fvl. l. c. (6).

## Groupe 7.

- 526 lusitanicum Grav. Fvl., 358.  
527 Manuelli Fvl. l. c. (7).

Groupe 8 (*Centrocnemis* Joseph) (8).

dilatatis, parce obsolete subsquamoso-punctulatis, abdomen dilatato, crebre subtilissime punctulato; ♂ segmentis 6-7 latius subobsolete impressis; 7° sat profunde in U formam inciso, 3, 4, 5 medio longitudinaliter sat profunde sulcatis. — L., 4 1/3 mill.

Sibérie, environs d'Irkutsk (*Dybowski*); Ochotsk!

(1) 514 a. *anale*\* Lucas, *Expl. Alg. Ent.*, 117, pl. 12, fig. 9. — *concinnum*\* Gouguet et H. Bris. *Ann. Ent. Fr.*, 1859, *Bull. 238*. — Espagne, Algérie, Tunisie.

+ 514 b. *apicale*\* Baudi, *Berl. Ent. Zeit.*, 1857, 102. — Chypre.

514 c. *Lethierryi*\* Reiche, *Mém. Soc. Linn. Norm.*, 1869, XV, 37. — Mars. *L'Abeille*, 1871, VIII, 318. — Algérie.

(2) 516 a. *albipes*\* Lucas, *Expl. Alg. Ent.*, 118, pl. 12, fig. 10. — Algérie.

+ 516 b. *gracile*\* Hampe, *Berl. Ent. Zeit.*, 1866, 371. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 315 (nec Solsky). — Hongrie.

(3) + 519 a. *rufipes* Hochh. *Bull. Mosc.*, 1851, III, 48. — Sibérie orient.

(4) + 520 a. *\*concolor* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 563. — Hochh. l. c., 1862, III, 72. — Solsky, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, VIII, 161; *Expl. Turkest.*, 1874, II, V, 186. — Boukharie, Mongolie.

(5) + 521 a. *\*rufescens* Mots. l. c., 1863, II, 563. — Hochh. l. c., 1862, III, 72. — *obscuriceps* Mots. l. c., 564. — Arménie.

(6) + 525 a. *\*sodale* Kraatz, *Nat.*, 687. — Bavière.

(7) 527 a. *quadricollis*\*.

*L. lusitanico* et *Manuelli* affine, colore nigro-piceo, ore, antennis, pedibus, segmentorum marginibus anōque rufotestaceis, capite angusto, lateribus parallelō, thorace quadrangulari, lateribus maxime parallelis, antennarum articulo secundo longiore, capite punctis minutis inter majores sparsis, thorace longiore, utrinque subtilius multo densius quam in *lusitanico*, vix seriatim punctato, scutello vix punctulato, elytris ut in *Manuelli* punctatis, humeris suturaque obscure rufopiceis, abdome dimidio subtilius densiusque punctulato primo visu distinctum; ♂ segmento 7° ut in *Manuelli* inciso, 6° integro, apice vix sinuato. — L., 6 1/2 mill.

Caramanie, Tarsous (*Peyron*); Syrie, Hidjaneh, Tibériade (*de la Brûlerie*).

(8) + 527 b. *\*kiriense* Joseph. *Berl. Ent. Zeit.*, 1869, 365. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 318. — Mont Terglou.

## SCIMBALIUM Er.

*Micorillus* Raffray.

- \*
- 528 planicollis Er. Fvl. Fn., 359; *Suppl.*, 43 (4).

- \*\*  
529 testaceum Er. Fvl., 360 (2).

## 530 pubipenne Fairm. Fvl., 364.

ACHENIUM Curtis.

- \*
- 531 striatum Latr. Fvl., 362 (3).  
\*\*  
532 ephippium Er. Fvl. l. c. (4).  
533 depresso Grav. Fvl. l. c. (5).

(1) + 527 c. *caucasicum*\* Cast. *Etud. Ent.*, I, 119. — Hochh. *Bull. Mosc.*, 1849, I, 136. — *anale* Nordm. *Symb.*, 153. — Er. *Gen.*, 580. — Caucase, Tauride.

(2) 528 a. *scabrosus*\*.

*S. subterraneo* colore rufescente affine, sed majus, oculis multo majoribus abdomine rufo-piceo distinctum; *testaceo* majus, alter coloratum, capite subtilissime alutaceo, elytris abdomine rufo fortius parvusque punctato-sebariuscalis, antennis longioribus, capite minus nitido, antice minus angustato, multo densius fortiusque punctato, thorace circa basin minus angustato, angulis posticis minus rotundatis, elytris magis parallelis, brevius parvusque pubescens, segmentorum marginibus rufulis certe distinctum; ♂ segmento 7° multo latius arcuatim vix inciso, post incisuram breviter impresso levigatoque, 6° integro. — L., 6 1/2 mill.

Tanger (*Olcese*).

*Obs.* Cet insecte est le *testaceum* indiqué de Tanger par MM. Fairmaire (*Ann. Ent. Fr.*, 1860, 159) et Reiche (*Cat. d'Algérie*, p. 37), et par moi-même (*Fn. gall.-rhén.*, III, 360).

+ 528 b. *subterraneum*\* Raffray, *Rev. Mag. Zool.*, 1873, 362, pl. 4, f. 44.

— Alger.

(3) + 531 a. *Sennacherib* Saulcy, *Ann. Ent. Fr.*, 1864, 646. — Mars. *L'Abeille*, 1871, VIII, 320. — Syrie, Palestine (*an. striatum var.?*).

(4) 531 b. *aquatum*\* Er. *Gen.*, 583. — Algérie, Egypte.

+ 531 c. *planum* Er. l. c. — Géorgie.

531 d. *rugipenne*\*.

Magnitudine *aquati*, colore basili, hoc majus, capite majore, antice magis dilatato, aequali, elytris parcius, dimidio fortius rugosiusque punctatis, basi transversim aequaliter nigris, punctis circa basin et latera linearim subseriatim, abdomine paulo fortius punctato, nigro, pedibus piceis aut rufo piceis, tarsis testaceis; ♂ segmento 7° multo latius profondiusque quam in *basali* triangulariter inciso, post incisuram impresso, usque ad basin laevi, subcanaliculato, 6° medio late, profunde impresso, margine relevato. — L., 8-9 1/2 mill.

Espagne, Madrid, St-Roch, Carthagène (*de la Brûlerie, Martinez y Saez*).

531 e. *debile* Er. l. c., 583. — Egypte, Syrie, Mésopotamie.

(5) 533 a. *basale*\* Er. l. c., 584. — Sardaigne, Corse, Italie, Chypre.

533 b. *picum*\*.

Forma elongata et colore *tenell*; dimidio fere majus, alatum, punctura triplo subtiliore densioreque capitisi thoracisque, hoc punctorum lineis duabus discoïdalibus medio profunde impressis, illo medio disco anguste levigato, elytris thorace paulo longioribus, subparallelis, subtiliter crebre vix rugose punctulatis, piceis, lateribus suturaque obscure rufis, abdominis punctura subtiliore densioreque, ano piceo facile distinguendum; ♂ segmento 7° sat late parum profunde triangulariter inciso. — L., 6 mill.

Tarsous.

533 c. *nigriventris*\* Fairm. *Ann. Ent. Fr.*, 1870, 372. — Mars. *L'Abeille*, 1871, VIII, 324. — Tanger.

533 d. *tenellum*\* Er. l. c., 587. — Sardaigne, Italie, Espagne, Algérie, Syrie.

\*\*\*  
534 humile Er. Fvl., 363 (1).  
535 rufulum Fairm. Fvl. l. c.

CRYPTOBIUM Mann.  
*Homœotarsus* Hochh.—*Spirosoma* Mots.

## TRIBU VIII. — STAPHYLININI Kraatz.

## SECTION I. — XANTHOLINI Kraatz.

DIOCHUS Er. (4).

537 Staudinger\* Kraatz. Fvl., 367.

OTHIUS Steph.

Cafius Lac.

\*

538 fulvipennis Fabr. Fvl., 368 (5).  
539 lapidicola Kiesw. Fvl. Fn., 369;  
Suppl., 44.

540 myrmecophilus Kiesw. Fvl. l. c.

\*\*

544 laeviusculus Steph. Fvl., 370.  
542 melanocephalus Grav. Fvl., 371.  
†543 brevipennis Kraatz. Fvl., l. c. (6).

## BAPTOLINUS Kr.

*Atreucus* Jacq. Duv. — *Gyrohypnus* Thoms.

544 pilicornis Payk. Fvl., 372.

545 affinis Payk. Fvl., 373.

546 longiceps Fvl., 374.

## LEPTACINUS Er.

\*

547 parumpunctatus Gyll. Fvl. l. c.

548 batychrus Gyll. Fvl., 375.

549 othoides Baudi. Fvl. l. c.

550 formicetorum Märk. Fvl., 377 (7).

## LEPTOLINUS Kr.

*Stenistoderus* Jacq. Duv.

551 nothus Er. Fvl., 378.

(1) † 533 e. *jejunum*\* Er. l. c. — Sardaigne.(2) 533 a. *Chaudoiri*\* Hochh. Bull. Mosc., 1851, III, 33. — Arménie, Chypre, Beyrouth.(3) † 536 a. *\*furcaticorne* Grimmer, Steierm. Col., 1841, 33 (Spec. max. dub.).

(4) Avant ce genre, se placent les:

PLATYPROSOPUS Mann.

Brachél., 36.

536 b. *beduinus*\* Nordm. Symb., 133. — Er. Gen., 293. — Lac. Gen., Atl., pl. 44, fig. 5. — Nubie, Egypte, Syrie.536 c. *elongatus*\* Mann. Brach., 36. — Casteln. Hist. Nat., I, pl. 12, fig. 8. — Er. l. c., 294. — Solsky, Expl. Turkestan., 1874, II, V, 184. — Crimée, Géorgie, Caucase, Turkestan.536 d. *hierichonticus*\* Reiche, Ann. Ent. Fr., 1856, 361, pl. 12, fig. 1. — Syrie, Chypre, Caramanie, Grèce.(5) 537 a. *grandis*\* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 99. — Lenkoran, Caucase, Tauride.(6) † 543 a. *\*pallidus* Brancs. Berl. Ent. Zeit., 1874, 134. — Styrie.† 543 b. *\*fulvipes* Mots. Bull. Mosc., 1858, III, 211. — Croatie (Gen. dub.).(7) 530 a. *laeviusculus*\* Solsky, Bull. Mosc., 1864, II, 442. — Sarepta.  
\*\*  
† 530 b. *\*scripticollis* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 106; 1862, III, 69. — Géorgie russe.

## STAPHYLINIDES. — STAPHYLININI.

## METOPONCUS Kr.

*Zeteotomus* Jacq. Duv. — *Cylindrocephalus* Mots.

552 brevicornis Er. Fvl., 380 (1).

## XANTHOLINUS Serv.

*Eulissus* Mann. — *Gyrohypnus* Steph. — *Vulda* Jacq. Duv. — *Agerodes* Mots. — *Nudobius* Thoms. — *Gauropterus* Thoms. — *Typhloides* Sharp.Groupe 1 (*Nudobius* Thoms.).

553 collaris Er. Fvl. Fn., 383; Suppl., 44 (2).

554 lentsus Er. Fvl., 384 (3).

Groupe 2. (*Eulissus* Mann. — *Agerodes* Mots. — *Gauropterus* Thoms.).

555 fulgidus Fabr. Fvl., l. c. (4).

Groupe 3 (*Gyrohypnus* Steph.).

556 punctulatus Payk. Fvl., 385.

Groupe 4 (*Vulda* Jacq. Duv.).

†557 gracilipes Jacq. Duv. Fvl. Suppl., 44.

†558 angusticollis Fvl. Suppl., 44. gracilipes Fvl. Fn., 386 (nec Jacq. Duv. Fairm.).

559 tenuipes Baudi. Fvl. Fn., 386; Suppl., 44.

Groupe 5 (*Xantholinus* gen. — *Typhloides* Sharp.).

\*

560 glabratus Grav. Fvl., 387.

561 relucens Grav. Fvl. l. c.

562 glaber Nordm. Fvl., 388 (5).

(1) † 532 a. *basalis*\* Aubé, Ann. Ent. Fr., 1850, 314. — *pictus* Mots, Etud. Ent., 1859, 430. — Batoum, Kachétie.+ 545 b. *\*tricolor* Brancs. Berl. Ent. Zeit., 1870, 418. — Mars. L'Abelle, 1871, VIII, 307. — Hongrie (*an basalis* var?).(2) + 533 a. *\*fasciatus* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 403. — Lenkoran.+ 533 b. *\*haematus* Kolen. Mel. Ent., III, 44. — Hochh. l. c., 408. — Transcaucase.(3) + 534 a. *\*umbratus* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 564. — Hochh. l. c., 1861, III, 67. — Arménie, Daghestan.(4) 535 a. *sanguinipennis*\* Kol. Mel. Ent., III, 14. — Hochh. l. c. 1849, I, 401. — Crète, Chypre, Arménie, Caucase, Perse sept.(5) 562 a. *hesperius*\* Er. Gen., 329. — Woll. Ann. Nat. Hist., ser. 3, 1860, VI, 100. — *limbatis* Watl. Reise Andal., II, 57. — *terminatus*\* Woll. in litt. — Espagne, Portugal, Madère, Barbarie, Sicile.562 b. *baicalensis*\*.Magnitude *glabi*; in genere notabilis; niger, nitidus, antennis præter basin, thorace abdomineque piceis, elytris, segmentorum marginibus lateribusque, anōque testaceis, antennarum articulis tribus primis pedibusque rufis; capite magno, elongato, ovato, utrinque crebre fortiter punctato, disco anguste fere usque ad basin lœvi, angulis posticis rotundatis; frontis sulculis longioribus, punctatis; thorace insigne, trapezoidalī, circa basin fortiter angustato, antice oblique longeque truncato, angulis omnibus obtusis, perspicuis; lineis duabus dorsilibus 10-11, late ralibus 7-8 punctatis, his punctis duobus posticis remotis; elytris thorace paulo brevioribus, fortiter parce, dorso lineatim punctatis, abdominalis punctura sparsa obsoletaque. — L, 6 1/3 mill.

Sur les bords du lac Baïkal, en août (Radde).

562 c. *subtevis*\*.Lept. *batychri* majoribus individuis subsimilis, colore *baicalensis*, sed elytris dilute testaceis, abdomine segmento 6º dimidio apice, totoque 7º rufulis; antennis rufis, articulis 4-10 subæqualibus, maxime transversis; capite subtriangulari, disco utrinque punctis aliquot, post oculos basique punctura sparsa subtiliore notato,

\*\*  
†563 myops Fvl. Fn., 389.  
564 barbarus Fvl. l. c.

\*\*\*

565 elegans Oliv. Fvl. l. c. (1).  
566 tricolor Fabr. Fvl., 390.  
567 distans Muls et Rey. Fvl., 391 (2).

\*\*\*\*

568 cribripennis Fvl. Fn., 390;  
*Suppl.*, 24 (3).  
569 linearis Oliv., Fvl., 392 (4).

## SECTION II. — STAPHYLINI Kraatz.

EMUS Curtis.

Creophilus Mann.

Groupe 1 (*Creophilus* Mann.).

570 maxillosus Linn. Fvl., 395.

Groupe 2 (*Emus* gen.).

571 hirtus Linn. Fvl. l. c. (5).

## LEISTOTROPHUS Perty.

*Schizochilus* Gray. — *Discocephalus*  
Nordm. — *Trichoderma* Steph. (*pro  
parte*).

572 nebulosus Fabr. Fvl., 396.  
573 murinus Linn. Fvl., 397 (6).

## STAPHYLINUS Linne.

*Trichoderma*, *Goerius*, *Tasgius* Steph.  
— *Anodus* Nordm. — *Ocypus* Er. —  
*Rhagochila*, *Matidus* Mots. — *Platy-  
dracus* Thoms.

Groupe 1 (*Trichoderma* Steph. (*pro  
parte*) Thoms.).574 chryscephalus Fourer. Fvl.,  
402.

575 pubescens De Géer. Fvl. l. c. (7).

sulcis frontalibus laevibus; angulis posticis obtusis; thorace circa basin minus quam in *baicalensi* angustato, antice minus longe oblique truncato, dorso bilineatum 3-6 punctato, punto postico remoto, linea exterior recta 3-punctata; punctis 4 circa angulum anteriorem; clytris parce subtilissime punctulatis, punctis circa suturam minus oboletis, serie dorsali multipunctata, abdome obsolete punctulato. — L., 5 mill.

Sibérie, environs d'Irkutsk (*Dybowski*).(1) † 564 a. *procerus*\* Er. Gen., 331. — Kraatz, Nat., 637 (*nec Hochh.*). — Germanie, Autriche, Espagne, Sardaigne.564 b. *decorus*\* Er. l. c., 324. — Kraatz, l. c., 639. — Hongrie, Croatie, Grèce.564 c. *rufipennis*\* Er. l. c., 322. — Peyron, Ann. Ent. Fr., 1838, 421. — *Titus*\* Saulcy, Ann. Ent. Fr., 1864, 642. — Sicile, Crète, Caramanie, Syrie, Perse mér.† 565 a. *fortepunctatus* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 564. — Hochh. l. c., III, 66. — Caucase.+ 565 b. *crassicornis* Hochh. l. c., 4851, III, 7. — Caucase, Abastumani.(2) 567 a. *variabilis*\* Hochh. l. c., 8. — Arménie.(3) 568 a. *translucidus*\* Scriba, Heyd. Reis. Span., 1870, 81. — Espagne.568 b. *rufipes*\* Lucas, Expl. Alg. Ent., 106, pl. 11, fig. 42. — Cordieri Boield. Ann. Ent. Fr., 1859, 464. — Sicile, Barbarie.(4) 569 a. *graculus*\* Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1858, 64. — Grèce, Algérie, Syrie.+ 569 b. *rufus* Grimmer, Stierm. Col., 1841, 33. — Styrie (Sp. max. dub.).+ 569 c. *styriacus* Grimm. l. c. — Styrie (Sp. max. dub.).(5) † 571 a. *ruficornis* Mén. Cat. Rais., 148. — Caucase (*Gen. dub.*).(6) † 573 a. *chalcopygus* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 113. — Arménie.573 b. *marginalis*\* Gené, Mén. Acad. Sc. Torin., 1830, XXXIX, 171, pl. 4, fig. 4. — Er. Gen., 361. — Sardaigne, Algérie.7) 575 a. *sibiricus*\* Gebler, Ledeb. Reis. App., III, 71; Bull. Mosc., 1847, IV, 400. — Er. Gen., 363. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 158. — Sibérie, Boukharie.Groupe 2 (*Staphylinus* gen. — *Pla-  
tydracus* Thoms.).

\*

576 chloropterus Panz. Fvl., 403 (1)

\*\*

577 fulvipes Scop. Fvl. l. c.

578 meridionalis Rosh. Fvl., 404.

579 stercorarius Oliv. Fvl. l. c.

580 lutarius Grav. Fvl., 405 (2).

581 chalceophalus Fabr. Fvl. l. c.

582 latebricola Grav. Fvl., 406.

\*\*\*

583 fossor Scop. Fvl. l. c.

\*\*\*\*

584 erythropterus Grav. Fvl., 407 (3)

585 caesareus Cederh. Fvl., 408.

Groupe 3 (*Goerius* Steph.).

\*

586 Baudii Fauv., 409.

587 olens Müll. Fvl. l. c.

588 italicus Arag. Fvl. l. c. (4).

589 alpestris Er. Fvl., 440.

590 brunnipes Fabr. Fvl. l. c.

\*\*

591 ophthalmicus Scop. Fvl., 411.

592 nitens Schr. Fvl. l. c. (5).

593 aethiops Waltl. Fvl., 412.

\*\*\*

594 mus Brullé. Fvl., 413.

595 picipennis Fabr. Fvl., 414 (6).

\*\*\*\*

596 fuscatus Grav. Fvl. l. c.

597 fulvipennis Er. Fvl., 415.

598 obscuræneus Fairm. Fvl., 416.

599 aenecephalus De Géer. Fvl., 417 (7).

Groupe 4 (*Tasgius* Steph.).

600 pedator Grav. Fvl. l. c. (8).

(1) † 576 a. *callistus* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 114. — Caucase.(2) † 580 a. *ussuriensis* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VII, 347. — Sibérie orientale.580 b. *dauricus*\* Mann. Brach., 22. — Er. Gen., 386. — *paganus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1874; I, 30. — Baïkal, Amour, Daourie, Japon.(3) 583 a. *chrysocomus*\* Mann. Brach., 21. — Er. Gen., 394 et syn. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VII, 347 et syn. — Sibérie occidentale, Daourie, Amour.584 a. *medioinxus*\* Fairm. Ann. Ent. Fr., 1852, 73; 1860, 136. — Harold. Cat. Col., 579 et syn. — Algérie, Maroc.(4) † 588 a. *rhæticus* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit., 1873, 85. — Tyrol (*italicus* var.?).588 b. *macrocephalus*\* Grav. Micr., 160. — Kraatz, Nat., 554 et syn. — Silésie, Voivynie, Autriche, Carpathes.(5) 591 a. *syriacus*\* Baudi, Stud. Ent., 124. — *Baudii*\* Peyr. Ann. Ent. Fr., 1838, 424. — *Ludovicus* Muls. God. Ann. Soc. Linn. Lyon., 1835, 263 (*forte*). — *planatus*\* Miller, in litt. — Syrie, Caramanie et ? Crimée.591 b. *megacephalus*\* Nordm. Symb., 63. — Kraatz, Nat., 555 et syn. — Cariinthie, Carniole.+ 591 c. *cyclopus* Peyr. Ann. Ent. Fr., 1858, 422. — Caramanie.(6) 593 a. *tomentosus*\* Baudi, Berl. Ent. Zeit., 1869, 384. — Mars, L'Abeille, 1871, VIII, 291. — Chypre, Trébizonde, Syrie, Algérie.+ 593 b. *fuscoœneus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 158. — Expl. Turkest., 1874, II, V, 173. — Samarkand (an var. *præcéd.*?).(7) † 599 a. *philonthoides* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 125. — Tiflis.+ 599 b. *quadraticeps* Mén. Cat. Rais., 1832, 149. — Fald. Fn. Transc., I, 419. — Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 117. — Mont Talych. (Sp. max. dub.).(8) † 600 a. *chalypeipennis* Mén. l. c., 143. — Fald. l. c., 117. — Talyche (an *pedator* var.?).+ 600 b. *protensus* Mén. Cat. Rais., 144. — Fald. Fn. Transc., I, 122. — Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 128. — Caucase.

601 ater Grav. Fvl., 418 (4).

*Groupe 5* (*Anodus Nordm.* — *Ocyphus Steph.* — *Matidus*, *Rhagochila Mots.*). \*

602 falcifer Nordm. Fvl., 419.

603 minax Muls. Rey. Fvl. l. c. (2).

604 edentulus Block. Fvl. l. c. (3).

605 tricinctus Arag. Fvl. l. c.

606 compressus Marsh. Fvl., 420 (4)

CAFIUS Steph.

Remus Holme (*nec Thoms.*).*Groupe 1.*

607 cribratus Er. Fvl., 422.

*Groupe 2.*

\*

608 cicatricosus Er. Fvl., 423.

609 fucicola Curt. Fvl. l. c.

(1) 601 a. *planipennis*\* Aubé, *Ann. Ent. Fr.*, 1842, 233. — Lucas, *Expl. Alg. Ent.*, 110, pl. 12, fig. 3. — *gagates*\* Baudi, *Stud. Ent.*, 1848, 123. — *Oliverii*\* Fauv. *Bull. Acad. Hipp.*, 1868, VI, 61. — Mars. *L'Abéille*, 1871, VIII, 292. — *atratus* Woll. *Cat. Canar.*, 1864, 367; *Col. Hesper.*, 1867, 278 (forté). — *fulvipes* Mén. *Mém. Ac. Sc. Petersb.*, 1849, VI, 43, pl. 2, fig. 1 (forté). — Sicile, Barbarie, Syrie, ? Canaries et Turcomanie.

(2) 602 a. *bellicosus*\* Fairm. *Ann. Ent. Fr.*, 1855, 312; 1860, 158, pl. 6, fig. 10. — Algérie, Maroc.

602 b. Solsky\*.

Capite multo latiore et breviore, thorace postice angustato, antennis rufis a *falcifero* omnino distinctus; magnitudine et forma deplanata, sicuti colore, *bellicosus* proprius, sed antennis articulis brevioribus, capite thoraceque magis depresso, triplo parcus punctatis, punctis subtilibus interjectis, linea longitudinali lœvi; capite tertia parte breviore, basi minus sinuato, angulis posticis rotundatis, multo minus proeminentibus; thorace breviore, magis parallelo, angulis anticis multo minus oblique truncatis, apice utrinque multo minus sinuato, elytris abdomineque multo subtilius densius punctatis, illis leviter coriaceis; ♂ latet. — L., 18 mill.

Sarepta (Becker).

*Obs.* Dédié à mon collègue et ami, M. S. de Solsky, dont les travaux sur la faune de Russie sont justement appréciés.

† 603 a. *\*limbifrons* Hochh. *Bull. Mosc.*, 1849, I, 127. — Arménie.

603 b. *rubripennis*\* Reiche, *Ann. Ent. Fr.*, 1856, 365. — Baudi, *Berl. Ent. Zeit.*, 1869, 385. — *olympicus*\* Baudi, l. c., 1857, 100. — Chypre, Palestine, Perse sept.

603 c. *nigrinus*\* Lucas, *Expl. Alg. Ent.*, 109, pl. 12, fig. 2. — Fairm. *Ann. Ent. Fr.*, 1860, 156. — Baudi, *Berl. Ent. Zeit.*, 1869, 385. — Andalousie, Algérie, Maroc.

† 603 d. *\*depressus* Hochh. *Bull. Mosc.*, 1849, I, 126. — Lenkoran.

(3) + 604 a. *\*forficularius* Mots. *Bull. Mosc.*, 1860, II, 569. — Hochh. l. c., 1862, III, 50. — Tiflis.

(4) \*

+ 606 a. *\*gracilicornis* Hochh. *Bull. Mosc.*, 1849, I, 120. — Lenkoran.

† 606 b. *\*inderiensis* Mots. *Bull. Mosc.*, 1845, I, 40; 1858, II, 669, pl. 1, fig. m.

— Hochh. l. c., 1862, III, 51. — Tartarie et Turcomanie.

† 606 c. *\*pullus* Hochh. l. c., 1849, I, 121. — Caucase.

PHYSOTROPS Mann.

Brach., 82.

† 606 d. *tataricus*\* Pall. *It. App.*, 74. — Sturm. *Cut.*, 1826, 61, pl. 1, fig. 9. — Er. *Gen.*, 414, et syn. — Solsky, *Expl. Turkest.*, 1874, II, V, 174. — Tartarie, Turkestan.

STAPHYLINIDAE. — STAPHYLININI.

XXIX

610 xantholoma Grav. Fvl., 424.

\*\*

611 sericeus Holme, Fvl., 425.

HESPERUS Fauv.

612 rufipennis Grav. Fvl., 426.

ACTOBIUS Fauv.

BISNIUS Thoms. (*nec Steph.*) — ERICHSONIUS Fauv.

\*

613 cinerascens Grav. Fvl., 428 (1).

614 rivularis Kiesw. Fvl. l. c.

615 signaticornis Muls. Rey. Fvl., 429.

\*\*

616 villosulus Steph. Fvl., 430.

617 orbus Kiesw. Fvl. l. c.

618 procerulus Grav. Fvl., 431.

619 semipunctatus Fairm. Germ. Fvl., l. c.

620 prolixus Er. Fvl., 432.

PHILONTHUS Curtis.

GABRIUS Steph. — BISNIUS Steph. — CHEILOCOLPUS Sol. — GEFYROBIUS Thoms.

*Groupe 1* (*Philonthus gen.* — *Bisnius Steph.*). \*

621 splendens Fabr. Fvl. Fn., 439; Suppl., 46.

622 intermedius Lac. Fvl. Fn., 439.

623 nitidus Fabr. Fvl., 440 (2).

624 cyaneipennis Fabr. Fvl., 441 (3).

625 proximus Kraatz, Fvl. l. c.

626 æneus Rossi, Fvl., 442.

627 addendus Sharp, Fvl., 443.

628 carbonarius Gyll. Fvl. l. c.

629 temporalis Muls. Rey. Fvl., 444 (4). \*\*

630 punctatus Grav. Fvl., 445 (5).

(1) + 613 a. *\*melanocephalus* Hochh. *Bull. Mosc.*, 1851, III, 25 (*nec Heer.*). — *nigriceps* Harold, *Cat. Col.*, 590. — Arménie.

(2) 623 a. *suturalis*\* Nordm. *Symb.*, 91. — Er. *Gen.*, 459. — *transbaicalicus\** Hochh. *Bull. Mosc.*, 1851, III, 10. — Solsky, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, 1871, VIII, 348. — Russie orientale, Sibérie, Daourie, Mongolie, Amour.

† 623 b. *\*rutilipennis* Hochh. *Bull. Mosc.*, 1851, III, 13. — Russie boréale (*an var. minor* *præced.*?).

(3) † 624 a. *\*aspalathinus* Er. *Gen.*, 436. — Kraatz, *Nat.*, 576. — Germanie mér.

(4) 629 a. *Piochardi*\*.

Magnitudine et facie *punctato affinis*, niger, nitidissimus, elytris subcæruleo virescentibus, parce subtiliter punctatis, parce breviter griseo pubescentibus, antennis ut in *carbonario*, sed articulo 4<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> paulo breviore, capite quadrato, minime transverso, punctis aliquot circa angulos basilaris, serie circulari 6-punctata medio disco disposita, thorace parvo, capitis circiter latitudine, basi quam antice non latiore, lateribus profunde sinuatis, angulis anticis posticisque parum obtusis, circa latera non impresso, disco utrinque 3-punctato, puncto postico exteriori remoto, elytris thorace paulo longioribus latioribusque, abdomen sat dense fortiter punctato, segmentis stria basali integra; ♂ capite majore; segmento 7<sup>o</sup> apice triangulariter inciso. — L., 8-10 mill.

Syrie, Naplouse (*de la Brûlerie*).

(5) 629 b. *insignitus*\*.

*Ph. punctato* sat vicinus, sed totus diversus, inter omnes capite subquadrato, thoraceque utrinque crebre multipunctatis, elytris subopacis, longe brunneo puberulis, subtilissime crebrim, scutello paulo parcus, abdomen nitido, irideo, piloso, parce fortiter punctatis; *punctato minor*, fronte inter antennas lœvi, thorace paulo breviore et latiore, linea angusta longitudinali lœvi, elytris paulo brevioribus, vix nigro-piceis, pedibus rufo-piceis; ♂ segmento 7<sup>o</sup> apice late obtuseque inciso, incisura vix triangulariter postice marginata. — L., 8 mill.

Sibérie, région du Baïkal, en août (Radde).

† 630 a. *\*ephippium* Nordm. *Symb.*, 110. — Er. *Gen.*, 507. — Solsky, *Bull.*

- \*\*\*  
 631 puella Nordm. Fvl., 446.  
 632 cephalotes Grav. Fvl. l. c.  
 633 nigritiventris Thoms. Fvl. l. c.  
 634 umbratilis Grav. Fvl., 447 (1).  
 \*\*\*\*  
 635 sordidus Grav. Fvl., 448.  
 636 plagiatus Fvl. l. c.  
 637 rufimanus Er. Fvl., 449.  
 638 alcyoneus Er. Fvl. l. c. (2).  
 639 suavis Ch. Bris. Fvl. l. c.

- \*\*\*\*  
 †640 Scribae Fvl., 450.  
 641 fuscus Grav. Fvl. l. c.  
 642 erythropterus Fvl., 454.  
 643 sanguinolentus Grav. Fvl. l.  
 c. (3).  
 644 immundus Gyll. Fvl., 452 (4).  
 645 ventralis Grav. Fvl., 453.  
 646 debilis Grav. Fvl., 454 (5).  
 647 discoideus Grav. Fvl. l. c. (6).

Mosc., 1869, I, 461. — *scutellatus* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 565. — Hochh. Bull. Mosc., 1862, III, 64. — Russie mér., Géorgie.  
 † 630 b. *\*Linki* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1866, IV, 81. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 296. — Samara.  
 + 630 c. *\*relatipennis* Solsky, Bull. Mosc., 1869, I, 461. — Expl. Turkest., 1874, II, V, 483. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 297. — Astrakan, Turkestan.  
 (1) + 634 a. *\*tanacitus* Hochh., Bull. Mosc., 1851, III, 14. — Russie mér.  
 + 634 b. *\*algoricus* Mots. Bull. Mosc., 1858, II, 653. — Algérie (*Spec. max. dub.*).  
 (2) 635 a. *viridipennis* \*

*Ph. alcyoneo* vicinus, primo visu statura dimidio minore, præsertim elytrorum colore obscuro puncturaque subtili densaque ut in *quisquiliaro* distinctus; antennis tenuibus, brevioribus quam in *alcyoneo*, elytris abdomineque multo brevius subtiliusque aureo pubescentibus, hoc multo densius subtiliter punctato, pedibus obscure piceis, coxis nigricantibus; ♂ segmenti 7<sup>o</sup> incisura multo minore, breviore angustioreque. — L., 4 1/2 - 4 3/4 mill.

Syrie, Tibériade, Bahr-el-Houleh (*de la Brûlerie*).

(3) 643 a. *ustulatus* \*

♂ Forma *discoidei*, inter *erythropterum* et *immundum* collocandus, hoc paulo minor et brevi, capite brevi, subquadrate, anteris articulis paulo brevioribus, thorace latiore, lateribus parallelis, sinuatis, elytris brevioribus, densius subtiliusque punctatis, rufis, lateribus summaque basi infuscatis, abdome haud versicolore, pedibus nigro-piceis; segmento 7<sup>o</sup> maxime diverso, latius multo minus profunde inciso, incisura angustissime marginato-impressa, 6<sup>o</sup> integro distinctus. — L., 6 1/3 mill.

Sibérie, région du Baikal ; juillet août (*Radde*) ; Daourie.

(4) + 644 a. *\*ruficornis* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 566. — Hochh. l. c., 1862, III, 58. — Russie mér.

(5) 646 a. *asperulus* \*

Magnitudine formaque *debilis*, nigro-piceus, elytris piceis, antennarum basi pendibus obscure testaceis, segmentorum marginibus anque vix dilutioribus, thorace paulo breviore, punctis subtilibus, circa basin subsericeo, elytris longioribus, minus depressis, triplo densius asperatim punctatis, brevius densiusque rufo pubescentibus, abdome dimidio densius subtiliusque punctato, multo densius puberulo; ♂ segmento 7<sup>o</sup> incisura profundiore. — L., 4 3/4 - 5 mill.

Syrie, Jaffa, Jérusalem (*de la Brûlerie*).

(6) 647 a. *cinctipennis* \*

Magnitudine *nigritulo*, colore *discoideo* vicinus, elongatus, antennis rufo-piceis, his articulo primo pedibusque testaceis, capite multo minore, suborbiculato, angulis posticis obtusis, collo minore, thorace angustiore, paulo longiore, angulis anticis magis oblique truncatis, elytris quadruplo densius subtiliusque, abdome triplo densius punctulatis, his humeris, apice suturaque rufis maxime distinctus; ♂ latet. — L., 3 3/4 mill.

Egypte, Le Caire (*Schaum, de la Brûlerie*).

## Groupe 2.

\*

- 648 laminatus Creutz. Fvl., 455.  
 649 rotundicollis Mén. Fvl., 456 (1).  
 650 atratus Grav. Fvl. l. c.

\*\*

- 651 nimbicola Fvl., 457.  
 652 montivagus Heer. Fvl. l. c.  
 653 laevicollis Lac. Fvl., 458.  
 654 ærosus Er. Fvl. l. c.

\*\*\*

- 655 dimidiatus Sahl. Fvl., 459.  
 656 a. ebeninus Grav. Fvl. l. c.  
 β. corruscus Grav. Fvl., 460.  
 657 frigidus Kiesw. Fvl., 461.  
 658 corvinus Er. Fvl., 462.  
 659 α. quisquiliarius Gyll. Fvl., 463.  
 β. inquinatus Steph. Fvl. l. c.

\*\*\*\*

- 660 dimidiatipennis Er. Fvl., 464.

Groupe 3 (*Gabrius Steph.*).

\*

- †661 anguinus Fvl. l. c. (2).  
 662 splendidulus Grav. Fvl., 465.  
 \*\*  
 663 fimetarius Grav. Fvl., 466.  
 664 astutus Er. Fvl., 467.  
 665 rubripennis Kiesw. Fvl. l. c.  
 666 pisciformis Fvl., 468.  
 667 badius Kiesw. Fvl. l. c. (3).  
 668 nigritulus Grav. Fvl., 469 (4).

\*\*\*

- 669 α. thermarum Aubé. Fvl., 470.  
 β. maritimus Mots. Fvl., 471.

Groupe 4 (*Cheilocolpus Sol.* — *Gefyr-robius Thoms.*).

\*

- 670 lætus Heer. Fvl., 472.  
 671 decorus Grav. Fvl. l. c. (5).  
 672 politus Fabr. Fvl., 473 (6).  
 673 Mannerheimi Fvl. l. c. (7).

(1) 649 a. *picipes* \*

*Ph. rotundicollis* forma et colore parum vicinus, inter omnes forma angustiore, magis parallela, antennis gracilloribus, articulis primis basi late rufis, capite magis rotundato, thoraceoque oculo fortissime armato subcoriacelis, minus nitidis, hoc lateribus haud impresso, elytris parvis, thorace vix brevioribus, multo parcus fortiter punctatis, abdome vix æneo, punctura subtili, maxime sparsa, pilis rarisi nigricantibus, pedibus obscure rufulis, coxis piceis, tibialis apice fuscis; ♂ segmento 7<sup>o</sup> late obtuseque emarginato, 5<sup>o</sup> simplici, maxime distinctus. — L., 9-10 mill.

Caucase (*de Chaudoir*).

(2) 660 a. *turbidus* \* Er. Gen., 484. — *punctipennis* \* Woll. Cat. Col. Mad., 4857  
 492. — *Pharao*\* Sankey, Ann. Ent. Fr., 1864, 639. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII,  
 300. — *rubiginosus*\* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1867, V, 30. — Madère, Egypte,  
 Syrie, Madagascar, Bourbon, Maurice, Assam.

(3) + 667 a. *\*brunneicollis* Hochh. Bull. Mosc., 1851, III, 20. — Kasan.(4) + 668 a. *\*coxalus* Hochh. l. c., 1872, III, 142. — Russie, Kiew.

(5) 671 a. *latiusculus*\* Hochh. Bull. Mosc., 1851, III, 15. — *immutatus*\* Mots. l. c., 1860, II, 569. — Hochh. l. c., 1862, III, 54. — *mongolicus*\* F. Sahlb. in litt. — Baikal, Amour, Daourie, Mongolie.

(6) + 672 a. *\*fugax* Falz. Fn. Transc., I, 125. — Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 134. — Caucase.

(7) 673 a. *laxatus*\* — *lucens*\* Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 133 (nec Mann, Er., Kr.).  
 Magnitudine et forma *lucens*, capite thoraceque non coriaceis, vix æneis, punctura elytrorum viridescentium minus densa, ut in *carbonarius*, præsertim abdomen adhuc fortius parcusque quam in *hochhuthi*, antennarum articulis ultimis longioribus quam in *lucenti*, capite post oculos minus punctato, thorace longiore, angustiore, antice magis angustato, punctis majoribus, coxis anterioribus testaceo-rufis; ♂ segmento 6<sup>o</sup> apice late emarginato, 7<sup>o</sup> sat profunde triangulariter inciso, incisura depressione postice longe prolongata marginataque maxime distinctus. — L., 8-9 mill.

Caucase (*de Chaudoir*).

Obs. Le *lucens* cité d'Arménie par Hochhuth (Bull. Mosc., 1862, III, 53) se rap-

- \*\*  
 674 lepidus Grav. Fvl., 474.  
 675 nitidulus Grav. Fvl., 475.  
 \*\*\*  
 676  $\alpha.$  varius Gyll. Fvl., 476.  
 $\beta.$  bimaculatus Grav. Fvl. l. c. (1).  
 \*\*\*\*  
 677 pullus Nordm. Fvl., 477 (2).  
 678 tenuis Grav. Fvl. l. c.  
 \*\*\*\*\*  
 679 marginatus Fabr. Fvl., 478.  
 680 fenestratus Fvl., 479.  
 681 cruentatus Gmel. Fvl. l. c.  
 682 strigulatus Er. Fvl., 480.  
 683 longicornis Steph. Fvl. l. c.  
 684  $\alpha.$  varians Payk. Fvl., 481.  
 $\beta.$  agilis Grav. Fvl., 482.  
 685 albipes Grav. Fvl. l. c. (3).  
 \*\*\*\*\*  
 686 fumarius Grav. Fvl., 483.  
 687 nigrata Grav. Fvl., 484.  
 688 micans Grav. Fvl. l. c. (4).  
 689 salinus Kiesw. Fvl., 485.  
 690 fulvipes Fabr. Fvl. l. c.  
 691 virgo Grav. Fvl., 486.  
 \*\*\*\*\*  
 692 vernalis Grav. Fvl., 487.  
 693 exiguis Nordm. Fvl., 488.  
 694 laticollis Fvl. l. c.

- SECTION III. — QUEDII Kraatz.  
 VELLEIUS Mann.  
 695 dilatatus Fabr. Fvl., 491.  
 QUEDIUS Steph.  
**Microsaurus, Raphirus** Steph. Thoms.  
**Groupe 1.**  
 696 riparius Kelln. Fvl., 498.  
 697 Kraatz Ch. Bris. Fvl., l. c.  
**Groupe 2.**  
 698 longicornis Kr. Fvl., 499.  
 699 microps Grav. Fvl., 500.  
**Groupe 3 (Quedius gen. — Microsaurus Thoms.).**  
 \*  
 700  $\alpha.$  curtus Er. Fvl., l. c.  
 $\beta.$  caeruleipennis Fvl., 501.  
 701 brevis Er. Fvl., l. c.  
 \*\*  
 702 crassus Fairm. Fvl., 502.  
 703 lateralis Grav. Fvl., l. c. (5).  
 704 brevicornis Thoms. Fvl., 503.  
 705 fageti Thoms. Fvl., l. c.  
 706 ochripennis Mén. Fvl., 504.  
 †707 puncticollis Thoms. Fvl., l. c.

porte sans doute à cette espèce. Quant au lucens Mann., c'est bien, d'après M. J. Sahlberg, qui a vu le type, l'atratus Grav.  
 (1) † 676 a. \*contiguus Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 568. — Hochh. l. c., 1862, III, 55. — Sibérie orient.  
 † 676 b. \*armeniacus Hochh. Bull. Mosc., 1851, III, 47. — Arménie (an bimaculati var.).  
 † 676 c. juvenilis\* Peyron, Ann. Ent. Fr., 1858, 426. — Caramanie.  
 676 d. escurialensis\* Perez Arcas, Ins. Nuev., 1865, 12. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 294. — Espagne, Portugal.  
 (2) 676 e. luxurians\* Er. Gen., 491. — Corse, Sardaigne.  
 † 677 a. \*formosus Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 567. — Hochh. l. c., 1862, III, 63. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 460; Expl. Turkest., 1874, II, V, 182. — Caucase, Daghestan, Turkestan, Asie centrale, Samarkand.  
 (3) 683 a. communis\* Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 568. — Hochh. l. c., 1862, III, 7. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1874, VIII, 349. — Baïkal, Daourie, Amour.  
 (4) † 688 a. \*rubellus Solsky, Expl. Turkest., 1874, II, V, 479. — Samarkand.  
 (5) † 703 a. \*transcaucasicus Falz. Fn. Transc., I, 129. — \*vicinus Mén. Cat. Rais., 144. — Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 147. — Caucase, Tiflis.

- 708 fulgidus Fabr. Fvl., 505.  
 709 mesomelinus Marsh. Fvl., 506.  
 710 ventralis Arag. Fvl., 507.  
 711 abietum Kiesw. Fvl., 508.  
 712  $\alpha.$  cruentus Oliv. Fvl., l. c.  
 $\beta.$  vires Rott. Fvl., 509.  
 713 xanthopus Er. Fvl., 510 (4).  
 714 scitus Grav. Fvl., l. c. (2).  
 715 infuscatus Er. Fvl., 511.

- \*\*\*  
 716 polystigma Wank. Fvl., l. c.

**Groupe 4.**

- 717 laevigatus Gyll. Fvl., 512.  
 718 pediculus Nordm. Fvl., 513.  
 719 cinctus Payk. Fvl., 514.

**Groupe 5 (Microsaurus Steph.).**

- 720 tristis Grav. Fvl., 515 (3).  
 721 fuliginosus Grav. Fvl., l. c. (4).  
 722 molochinus Grav. Fvl., 516.  
 723 unicolor Kiesw. Fvl., 517.

**Groupe 6.**

- \*  
 724 ochropterus Er. Fvl. l. c. (5).  
 725 picipes Mann. Fvl., 518 (6).  
 726 robustus Scrib. Fvl. l. c.  
 727 dubius Heer. Fvl., 519 (7).  
 728 umbrinus Er. Fvl., 520 (8).  
 729 nigriceps Kr. Fvl., 521.  
 præcox Fvl., 521 (olim.).  
 \*\*  
 730 fumatus Steph. Fvl., 522 (9).

(1) + 713 a. \*cælebs Rottenb. Berl. Ent. Zeit., 1870, 28. — Mars. L'Abeille, 1871, VIII, 278. — Sicile.  
 + 713 b. \*vulneratus Har. Cat. Col., 572. — \*plagiatus Hochh. Bull. Mosc., 1849, I, 449 (nec Mann.). — Caucase.  
 (2) + 714 a. \*lentus Mots. Bull. Mosc., 1860, II, 571. — Hochh. l. c., 1862, III, 44. — Géorgie russe.  
 (3) + 720 a. \*fulvipennis Hochh. Bull. Mosc., 1851, III, 28. — Daourie.  
 (4) + 721 a. \*latus Hochh. l. c., 30. — Caucase.  
 (5) + 724 a. \*brevipennis Mots. Bull. Mosc., 1858, II, 636 (nec Fairm.). — Carniole (Sp. dub.).  
 (6) 724 b. coloratus\*.  
 Q. *picipedi* forma coloreque similis, sed primo visu elytris magis nitidis, tertia parte longioribus, minime rugosulis, multo fortius parciusque, ut in *ochripenne* punctatis, antennis articulis brevioribus, capite breviore, subtransverso, oculis magis prominentibus, abdome parcius punctato, viridi-irideo; ♂ segmento 6° apice minus emarginato, 7° paulo profundius inciso facillime distinguendus. — L., 9-10 mill.

Syrie, Naplouse, Djebel-ech-Cheik (de la Brûlerie).

(7) 727 a. *plancus* Er. Gen., 538. — *umbrinus* var. Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1858, 59. — Baudi, l. c., 1869, 384. — Sardaigne, Grèce, Chypre, Caramanie.  
 (8) + 728 a. *semiruber*\* Fvl.

Forma *picipedis*, eodem modo coloratus, sed antennis articulis 2-3 præster basin fuscis; magnitudine puncturaque elytrorum abbreviatorum *umbrino*, capitis forma *fumato* similis; ab *umbrino* antennarum articulis longioribus, thoracis angulis posterioribus fortiter rotundatis, nec subangulatis, punctura elytrorum ruforum abdominisque irideo-virescentis paulo parciore, his paulo longioribus, pedibus rufis; ♂ segmento 7° apice minus profunde inciso, post incisuram non impresso. L., 6 1/2 mill.

Pologne (Ch. Brisout de Barnevillle).

(9) + 780 a. *inflatus*\*.  
 Unicus in genere magnitudinē, forma antice posticeque fortiter attenuata; colore *molochini*, sed thorace subpicte abdomenque dilatato magis irideo-virido, ut in *picipedi* punctato; inter omnes insignis capite minuto, breviter ovato, antennis ut in hoc conformatis, vix tenuioribus, thorace convexo, antice fortiter angustato,

- 731 *præcox* Grav. (*nec Fauv. olim.*).  
*Ernestini* Fvl. *l. c.*  
 732 *oblitteratus* Er. Fvl., 523.  
 733 *coxalis* Kr. Fvl. *l. c.* (1).  
 734 *suturalis* Kiesw. Fvl., 524.  
 735 *limbatus* Heer. Fvl., 525 (2).  
 736 *maurorufus* Grav. Fvl., 526.  
 \*\*\*  
 737 *scintillans* Grav. Fvl., 527.  
 738 *lucidulus* Er. Fvl. *l. c.*
- Groupe 7 (Raphirus Steph.).*  
 \*  
 739 *pyrenæus* Ch. Br. Fvl., 528 (3).  
 \*\*  
 740 *auricomus* Kiesw. Fvl., 529.  
 741 *alpestris* Heer. Fvl. *l. c.*  
 \*\*\*  
 742 *virgulatus* Er. Fvl., 530 (4).  
 743 *rufipes* Grav. Fvl. *l. c.*  
 744 *semiaeneus* Steph. Fvl., 531.  
 745 *attenuatus* Gyll. Fvl., 532.  
 746 *acuminatus* Hochh. Fvl., 533.  
 747 *paradisianus* Heer. Fvl. *l. c.*  
 748 *fulvicollis* Steph. Fvl. *l. c.*  
 749 *picipennis* Scrib. Fvl. *l. c.*
- 750 *α. boops* Grav. Fvl., 534.  
*β. brevipennis* Fairm. Fvl., 535 (5).
- HETEROTHOPS* Steph.  
*Trichopygus* Nordm.
- 751 *binotata* Grav. Fvl., 536.  
 752 *prævia* Er. Fvl., 537 (6).  
 753 *quadripunctula* Grav. Fvl., 538.  
 754 *dissimilis* Grav. Fvl. *l. c.*
- ASTRAPEUS* Grav.
- 755 *ulmi* Rossi, Fvl., 540.
- EURYPORUS* Er.
- Pelecyphorus* Nordm.
- 756 *picipes* Payk. Fvl., 541 (7).
- ACYLOPHORUS* Nordm.
- 757 *Wagenschieberi* Kiesw. Fvl., 542.
- 758 *glabriocollis* Lac. Fvl. *l. c.* (8).
- TANYGNATHUS* Er.
- 759 *terminalis* Er. Fvl., 544.

*angulis posticis obtusis, scutello circa apicem punctato, elytris amplis, thorace paulo latoribus, non longioribus, adhuc crebrius subtiliusque quam in molochino punctatis, segmentorum marginibus violaceis; ♂ segmento 7º apice sat late obtusius inciso, post incisuram triangulariter parum impresso.* — L., 8-9 mill.

Napouse, Wadi-el-Melek (*de la Brûlerie*).

(1) 733 a. *Josue*\* Sauley, Ann. Ent. Fr., 1864, 636. — Mars. *L'Abeille*, 1871, VIII, 279. — Syrie, Chypre.

(2) 738 a. *sparsutus*\*.

*Q. marginali* maxime vicinus, antennis brevioribus, thorace latiore brevioreque, antice minus angustato, elytris abbreviatis, hoc tertia parte brevioribus, multo parcus fortiter punctatis, totis piecīs, humeris anguloque apicali externo vix dilutioribus, abdome vix irideo, segmentorum marginibus vix dilutis; ♂ segmento 7º apice paulo latius inciso, post incisuram vix impresso. — L., 5 1/2-6 1/4 mill.

Région du Baïkal, Irkutsk, en juillet et septembre (Radde).

(3) 739 a. *cincticollis*\* Kraatz, Nat., 508. — Autriche.  
 (4) 741 a. *collaris*\* Er. Gen., 545. — Kraatz, Nat., 515. — Germanie, Russie.  
 (5) + 750 a. *incompletus* Hochh., Bull. Mosc., 1849, I, 453. — Tiflis (*Sp. dub.*).  
 (6) + 752 a. *\*nitens* Nordm. Symb., 138. — Er. Gen., 518. — Crimée.  
 (7) 733 a. *aneiventris*\* Luc. Expl. Alg. Ent., 145, pl. 42, fig. 5. — *meridionalis*\* Baudi, Stud. Ent., I, 133. — Italie, Sicile, Espagne, Algérie.  
 (8) + 758 a. *\*nitidus* Mots. Bull. Mosc., 1845, I, 40. — Géorgie.

## TRIBU IX. — TACHYPORINI Kraatz.

## SECTION I. — TACHYPORI Thoms.

*BOLITOBIUS* Steph.*Lordithon* Th.*Groupe 1 (Bolitobius gen.).*760 *lunulatus* L. Fvl., 547 (4).761 *speciosus* Er. Fvl., 548.762 *pulchellus* Mann. Fvl. *l. c.* (2).*Groupe 2 (Lordithon Th.).*†763 *bicolor* Grav. Fvl., 549 (3).764 *trimaculatus* Payk. Fvl. *l. c.*765 *trinotatus* Er. Fvl. *l. c.* (4).766 *exoletus* Er. Fvl., 554.767 *pygmæus* Fabr. Fvl. *l. c.* (5).♂ *biguttatus* Steph. Fvl., 552.*MEGACRONUS* Steph.*Bryocaris* Lac. — *Bryoporus* Er.*Groupe 1 (Megacronus Th. nec Steph.).*768 *striatus* Oliv. Fvl., 554.*Groupe 2 (Megacronus Steph. nec Th. — Bryocaris Lac. Th. — Bryoporus Kr. Th.).*

\*

769 *cingulatus* Mann. Fvl. *l. c.* (6).770 *analis* Fabr. Fvl., 555.

\*\*

771 *inclinans* Grav. Fvl., 556.†772 *punctulatus* Heer Fvl. *l. c.*773 *formosus* Gray. Fvl. *l. c.*

\*\*\*

774 *cernuus* Grav. Fvl., 558 (7).775 *rufus* Er. Fvl. *l. c.*776 *rugipennis* Pand. Fvl., 559.†777 *castaneus* Hardy et Bold. Fvl., 560.*MYCETOPORUS* Mann.*Ischnosoma* Steph. Th.*Groupe 1 (Ischnosoma Th. nec Steph.).*778 *splendidus* Grav. Fvl., 562 (8).

(1) + 760 a. *\*rostratus* Mots., Bull. Mosc., 1860, II, 573. — Hochh., *l. c.*, 4862, III, 40. — Mars., *L'Abeille*, 1867, IV, 163. — Pand., Ann. Ent. Fr., 1869, 360 note et 366. — Caucase central.

(2) 762 a. *arcuatus*\* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 238. — Baikal,

(3) + 763 a. *\*Maacki* Solsky, *l. c.*, 286. — Baikal.

(4) + 765 a. *\*flavicollis* Hochh., Bull. Mosc., 1849, I, 95. — Caucase.

(5) + 767 a. *\*Phædrus* Kol., Melet. Ent., III, 14. — Hochh., Bull. Mosc., 1849, I, 97. — Caucase.

+ 767 b. *\*nullus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1871, VIII, 456. — Expl. Turkestan, 1874, II, V, 470. — Samarkand.

(6) + 768 a. *\*insignis* Hochh., Bull. Mosc., 1849, I, 92. — Caucase.

(7) + 773 a. *multipunctatus*\* Hampe, Berl. Ent. Zeit., 1866, 374. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 270. — Croatie, Styrie.

(8) 777 a. *elegans*\* Mœckl., Bull. Mosc., 1846, I, 476. — Pand., Ann. Ent. Fr., 1869, 339. — Finlande, Lithuanie.

+ 778 a. *spelæus*\* Scriba, Heyd. Reis. Span., 1870, 80. — Espagne.

Groupe 2 (*Mycetoporus* gen. — *Ischnosoma* Steph.).

\*

- †779 Brucki Pand. Fvl., 563.  
780 rufescens Steph., Fvl., 564.  
781 Märkeli Kr. Fvl., 565.  
782 nanus Er. Fvl. l. c. (4).  
Baudueri\* Muls. Rey. Fvl. Suppl.

\*\*

- 783 punctatus Gyll. Fvl., 566 (2).  
784 punctipennis Scriba. Fvl. l. c.

\*\*\*

- 785 brunneus Marsh. Fvl., 567 (3).  
\*\*\*\*

- †786 pachyraphis Pand. Fvl., 569 (4).  
787 niger Fairm. Fvl., 570.  
788 angularis Muls. Rey. Fvl. l. c.  
789 Reichei Pand. Fvl., 571.

\*\*\*\*\*

- 790 splendens Marsh. Fvl., 572 (5).  
†791 forticornis Fvl. l. c.  
792 clavicornis Steph. Fvl., 573.

## TACHINUS Grav.

*Ellipsotomus* Mots. — *Ellipotoma* Mots.  
— *Drymoporus* Th.

\*

- 793 discoideus Er. Fvl., 576.

\*\*

- 794 elongatus Gyll. Fvl., 577.  
795 Bonvouloiri Pand. Fvl., 578.  
796 fimetarius Grav., Fvl. l. c.

\*\*\*

- 797 subterraneus L. Fvl., 579.

\*\*\*\*

- 798 rufipennis Gyll. Fvl., 580 (6).  
\*\*\*\*\*

- 799 collaris Grav. Fvl., 581.  
800 flavolimbatus Pand. Fvl., 582.  
801 marginellus Fabr. Fvl. l. c.  
802 laticollis Grav. Fvl., 583 (7).  
803 flavipes Fabr. Fvl., 584.  
804 proximus Kr. Fvl., 585.  
805 humeralis Grav. Fvl. l. c.  
806 pallipes Grav. Fvl., 586.

(1) 782 a. *debilis*\* Mækl., *Symb.*, 14. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 342. — Finlande.

+ 782 b. *\*crassicornis* Mækl., l. c., 9. — Kraatz, *Berl. Ent. Zeit.*, 1861, 412. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 343, 361. — Finlande.

(2) + 782 c. *\*marginatus* Kraatz, *Nat.*, 457. — Pand., l. c., 348. — Saxe.  
(3) + 783 a. *\*lapponicus* Thoms., *Skand. Col.*, III, 164. — Pand., l. c., 351, 364. — Laponie.

(4) + 783 b. *Chevrolati*\* Pand., l. c., 345. — Caramanie.  
(5) + 789 a. *\*aqualis* Thoms., *Skand. Col.*, X, 323. — Mars., *L'Abeille*, VIII, 272. — Scandinavie.

+ 789 b. *\*ruficollis* Mækl., *Symb.*, 7. — Kraatz, *Berl. Ent. Zeit.*, 1861, 412. — Thoms., *Skand. Col.*, IX, 304. — Scandinavie, Styrie.

(6) + 798 a. *\*Manueli* Sharp, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, 1874, 318. — Piémont.  
798 b. *basalis*\* Er., *Gen.*, 262. — Seidl., *Fn. Balt.*, 285. — *circumcinctus*\* Mækl., *Bull. Mosc.*, 1852, II, 310. — *nitidus*\* Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 313 (1).

— *berezynicus*\* Wank., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 418. — Lithuania, Oural, Baïcal, Amour, Amérique russe.  
+ 798 c. *\*nivalis* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 574. — Hochh., l. c., 4862, III, 34. — Mars., *L'Abeille*, 1867, IV, 464. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 331. — Alpes du Daghestan.

(7) + 802 a. *\*latiusculus* Kiesw., *Stett. Ent. Zeit.*, 1848, 320. — Kraatz, *Nat.*, 415. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 316. — Riesengebirge.

(1) M. Pandellé me cite par erreur comme ayant décrit cette espèce.

- 807 *scapularis* Steph. Fvl., 587.  
808 *bipustulatus* Fabr. Fvl., 588.  
809 *rufipes* de Gér. Fvl., 589 (1).

## HABROGERUS Er.

- 810 *capillaricornis* Grav. Fvl., 591.

## CILEA Jacq. Duv.

- Erichomus* Mots. — *Leucoparyphus* Er.  
— *Coproporus* Kr. — *Astibus* Th.

\*\*

- 811 *colchica* Kr. Fvl., 592.

\*\*

- 812 *silphoides* L. Fvl. l. c.

## TACHYPORUS Grav.

## Lamprinus Heer.

- Groupe 1 (*Tachyporus* gen.).

\*

- 813 α. *obtusus* Linn. Fvl., 595 (2).

- 820 *atriceps* Steph. Fvl., l. c.  
821 *ruficollis* Grav. Fvl., 600.  
822 *macropterus* Steph. Fvl., 601.  
823 *pusillus* Grav. Fvl., 602.  
824 *nitidulus* Fabr. Fvl., l. c. (4).  
825 *transversalis* Grav. Fvl., 603 (5).

- Groupe 2 (*Lamprinus* Heer.).

\*\*

- 826 *saginatus* Grav. Fvl., 604 (6).

(4) + 809 a. *\*rufitarsis* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1849, I, 90. — Solsky, *Expl. Turkest.*, 1874, II, V, 467. — Caucase, Samarkand.

+ 809 b. *\*nigerrimus* Solsky, *Bull. Mosc.*, 1864, II, 437. — Mars., *L'Abeille*, 1867, IV, 196. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 334. — Géorgie.

+ 809 c. *\*caucasicus* Kol., *Melet. Ent.*, III, 13. — Hochh., *Bull. Mosc.*, 1851, III, 6. — Caucase.

809 d. *Fauveli*\* Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 321. — Deyrollei Sharp., *Rev. Mag. Zool.*, 1873, 411. — Caucase.

+ 809 e. *\*cingulatus* Solsky, *Bull. Mosc.*, 1864, II, 435. — Mars., *L'Abeille*, 1867, IV, 194. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 324. — Géorgie.

809 f. *\*marginatus* Gyll., *Ins. Suec.*, II, 235. — Kraatz, *Nat.*, 406 et syn. — Thoms., *Skand. Col.*, III, 156; IX, 302. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 320. — Germanie, Scandinavie, Russie, Baïkal, Amour.

+ 809 g. *\*apterus* Mækl., *Bull. Mosc.*, 1853, III, 186. — *\*arcticus* Mots., Schrenck, *Reis.*, 1860, 124, pl. 8, fig. 17 (veresim.). — Sibérie, Amérique russe.

(2) + 813 a. *\*caspius* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 375. — Hochh., l. c., 1862, III, 36. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 309. — Daghestan, Mer Caspienne.

+ 813 b. *\*flavipes* Mækl., *Bull. Mosc.*, 1846, I, 473. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 309. — Finlande.

(3) 817 a. *jocosus*\* Say, *Trans. Amer. Soc. Phil.*, 1832, IV, 466. — *arduus*\* Er., *Gen.*, 287. — Finlande, Amérique septentrionale.

+ 817 b. *\*centrimaculatus* J. Sahlb., *Not. Fn. Flor. Fenn. Forh.*, 1874, 420. — Laponie.

+ 817 c. *\*obscurellus* Zett., *Ins. Lapp.*, 54. — Er., *Gen.*, 242. — Thoms., *Skand. Col.*, III, 151. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 309. — Laponie.

(4) + 824 a. *\*nigriceps* Mann., *Brach.*, 59. — Er., *Gen.*, 242. — Pand., l. c., 308. — Finlande.

(5) + 825 a. *\*carbonarius* Grimm., *Steierm. Col.*, 1841, 35. — Styrie (*Gen. dub.*). \*

(6) 825 q. *pictus*\* Fairm., *Ann. Ent. Fr.*, 1832, 74. — Pand., l. c., 1869, 298. —

## XXXVIII STAPHYLINIDÆ. — ALEOCHARINI.

†827 *haematopterus* Kr. Fvl. *l. c.* (1).  
828 *erythropterus* Panz. Fvl., 605.

CONURUS Steph.

Conosomus Mots. — Conosoma Kr.

\*

829 *bipunctatus* Grav. Fvl., 607.

\*\*

830 *bipustulatus* Grav. Fvl., 608(2).

\*\*\*

831 *littoreus* Linn. Fvl., 609.

\*\*\*\*

832 ♂. *pubescens* Payk. Fvl. *l. c.*  
♀. *immaculatus* Steph. Fvl.,  
610 (3).833 *pedicularius* Grav. Fvl., 611.834 *monticola* Woll. Fvl. *l. c.*

## SECTION II. — HYPOCYPTI Thoms.

HYPOCYPTUS Mann.

Cypha Steph.

Groupe 1.

†835 Pirazzolii Baudi. Fvl., 613 (4).

Groupe 2.

\*

836 *longicornis* Payk. Fvl., 614 (5).

\*\*

837 *rubripennis* Pand. Fvl., 615.838 *apicalis* Ch. Bris. Fvl. *l. c.*839 *seminulum* Er. Fvl. *l. c.*840 *ovulum* Heer Fvl., 616.841 *discoideus* Er. Fvl. *l. c.*842 *laeviusculus* Mann. Fvl., 617.

## SECTION III.—TRICHOPHYÆ Thoms.

TRICHOPHYA Mann.

843 *pilicornis* Gyll. Fvl., 618.

## TRIBU X. — ALEOCHARINI Kraatz.

## SECTION I. — GYMNUSE Kraatz.

845 *brevicollis* Payk. Fvl., 622.

GYMNUSA Grav.

DINOPSIS Matth.

844 *variegata* Kicsw. Fvl., 621.846 *erosa* Steph. Fvl., 623.

*Fairmairei*\* Lepr., *l. c.*, 4853, *Bull. 440*. — *luctuosus* Fairm., *l. c.*, 4855, 342. — Espagne, Italie, Sicile, Chypre, Algérie.

(1) † 827 a. \**nigricornis* Gyll., *Ins. Suec.* IV, 469. — Er., *Gen.*, 242. — Thoms., *Skand. Col.*, III, 452. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 307. — Westrogothie.

(2) 830 a. *binotatus*\* Grav., *Micr.*, 132. — Er., *Gen.*, 824 et syn. — Kraatz, *Nat.*, 438 et syn. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 293. — Prusse, Bohême.

† 830 b. *Wankowiczi*\* Pand., *l. c.*, 294. — Pologne, Lithuanie.

† 831 a. \**erythrocephalus* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1849, I, 76. — Caucase.

(3) † 832 a. \**dimidiatus* Hochh., *l. c.*, 84. — Caucase.


† 832 b. \**erythrinus* Hochh., *l. c.*, 1872, III, 126. — Kiew.

(4) † 834 a. *grandicornis*\* Fairm., *Ann. Ent. Fr.*, 1860, 152. — Pand., *l. c.*, 284.

— *pictus* Mots., *Bull. Mosc.*, 1858, III, 223 (*fortè*). — Algérie, ? Égypte.


(5) † 835 a. \**tenuicornis* Kraatz, *Nat.*, 388; *Bert. Ent. Zett.*, 1858, 54. — Grèce.

† 835 b. *unicolor* Rosh., *Thier. Andal.*, 68. — Pand., *Ann. Ent. Fr.*, 1869, 284. — Espagne, Algérie.




Picart sc.

*Staphylinides. I.*




A. Faure et Poujade del.

*Staphylinides. II.*



A.Fauvel et Poujade del.

*Staphylinides. III.*



A.Fauvel et Poujade del.

*Staphylinides. IV.*

- MYLLÆNA Er.  
Centroglossa Matth.
- 847 dubia Grav. Fvl., 625.  
848 intermedia Er. Fvl. l. c.  
849 gracilicornis Fairm. et Ch. Bris. Fvl., 626.  
850 elongata Matth. Fvl. l. c. (1).  
851 brevicornis Matth. Fvl., 627.  
852 minuta Grav. Fvl., 628.  
833 gracilis Matth. Fvl. l. c.  
854 infuscata Kr. Fvl. l. c.
- SECTION II.—GYROPHÆNAE Kraatz.
- ENCEPHALUS Westw.
- 855 complicans Westw. Fvl., 630 (2).
- GRYOPHÆNA Mann.
- Agaricochara Kr.—Phænogryra Muls. Rey.
- Groupe 1 (Gyrophæna gen.).*  
\*  
856 pulchella Heer. Fvl., 633.  
857 affinis Sahlb. Fvl., 634.  
\*\*  
858 nitidula Gyll. Fvl., 635.  
\*\*\*  
859 nana Payk. Fvl., 636.  
860 gentilis Er. Fvl. l. c.  
861 fasciata Marsh., Fvl., 637.  
862 bihamata Thoms. Fvl., 638.  
863 laevipennis Kr. Fvl., 639.  
864 lucidula Er. Fvl. l. c.  
\*\*\*\*  
†865 rugipennis Muls. Rey. Fvl., 640.  
866 Poweri Crotch. Fvl. l. c.  
867 minima Er. Fvl., 641.  
868 manca Er. Fvl., 642.
- Groupe 2 (Agaricochara Kr.—Phænogryra Muls. Rey.).*  
\*  
869 strictula Er. Fvl., 643.  
870 polita Grav. Fvl., 644.  
\*\*  
871 laevicollis Kr. Fvl. l. c.  
872 aspera Fvl. l. c.  
873 boleti L. Fvl., 645 (3).
- BRACHIDA Muls. Rey.
874. notha Er. Fvl., 646.
- SECTION III.—ALEOCHARÆ Kraatz.
- OLIGOTA Mann.
- Holobus Sol.—Microcera Mann.—Somaticum Woll.—Microcera Th. nec Mann.).
- Groupe 1 (Holobus Sol.—Somaticum Woll.—Microcera Th. nec Mann.).*  
\*  
875 flavicornis Lac. Fvl., 655.  
876 apicata Er. Fvl., 656.
- Groupe 2 (Oligota gen.—Microcera Mann.—Logiota, Golioti Muls. Rey.).*  
\*  
877 granaria Er. Fvl., 657.  
\*\*  
878 rufipennis Kr. Fvl. l. c.  
\*\*\*  
879 inflata Mann. Fvl., 658.  
880 parva Kr. Fvl., 659.  
\*\*\*\*  
881 punctulata Heer. Fvl., 660.  
882 atomaria Er. Fvl., 661.  
883 pusillima Grav. Fvl., 662.  
884 pumilio Kiesw. Fvl. l. c.

(1) † 850 a. \*fulvicollis Mots., Bull. Mosc., 1858, III, 223. — Carniole.  
850 b. grecæ\* Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1858, 34. — Corse, Grèce, Algérie.  
2) † 855 a. \*Kraatzi Hochh., Bull. Mosc., 1872, III, 118. — Kiew.  
3) † 837 a. \*rugicollis Hochh., Bull. Mosc., 1872, III, 120. — Kiew (Gen. dub.).

- CYPHEA Fauv.
- 885 curtula Er. Fvl., 664.
- PLACUSA Er.
- Calpusa Muls. Rey.  
\*  
886 complanata Er. Fvl., 666.  
887 humilis Er. Fvl., 667.  
\*\*  
888 atrata Sahlb. Fvl., 668.  
889 pumilio Grav. Fvl., 667.  
\*\*\*  
890 infima Er. Fvl., 668.  
\*\*\*\*  
891 adscita Er. Fvl., 669.
- HOMALOTA Mann.
- Aleconota, Hydrosmeeta, Coprothassa, Acrotona, Amischa, Amidobia, Bessobia, Plataraea, Halobrechta, Enalodroma, Disopora, Liogluta, Thinobaea, Atheta, Dochmonota Thoms. — Earota, Colpodota, Chætida, Badura, Pycnota, Microdota, Ceritaxa, Felurga, Phryogora, Traumæcia, Anopleta, Heteronomata, Ouralia, Meotica, Metaxya, Thianæcia, Hygræcia, Geostiba Muls. Rey.
- Groupe 1 (Coprothassa, Acrotona Th.—Colpodota, Badura Muls. Rey.).*  
\*  
892 sordida Marsh. Fvl., 673.  
893 cibrata Kr. Fvl., 674.  
894 nigerrima Aubé. Fvl. l. c. et Suppl.  
\*\*  
895 subsinuata Er. Fvl., 675.  
896 parva Sahlb. Fvl., 676.  
897 fuscipes Heer. Fvl. l. c. (1).  
898 tenera Sahlb. Fvl., 677.
- Groupe 3 (Sipalia Th. (nec Muls. R.)—Atheta Th. (pro parte), Dochmonota, Plataraea, Amischa Th.—Ceritaxa, Anopleta Muls. R.—Geostiba Muls. R. (nec Th.).*  
\*  
923 inquinula Grav. Fvl., 700.  
924 mortuorum Th. Fvl., 704.  
925 spatula Fauv. l. c.  
926 indubia Sharp. Fvl., 702.  
927 atomaria Kr. Fvl. l. c. et Suppl.
- 899 pulchra Kr. Fvl., 678.  
900 vagipunctata Woll. Fvl. l. c.  
901 parens Muls. Rey. Fvl., 680.  
902 orphana Er. Fvl. l. c.  
\*\*\*  
903 pygmæa Grav. Fvl., 681 (2).  
904 aterrima Grav. Fvl. l. c.  
905 laticollis Steph. Fvl., 682.  
906 fungi Grav. Fvl., 683.  
907 macrocera Th. Fvl., 684.  
908 cauta Er. Fvl., 685.
- Groupe 2 (Atheta Th. pro parte.—Chætida, Microdota Muls. Rey.).*  
\*  
909 longicornis Grav. Fvl., 687 (3).  
910 celata Er. Fvl., 688 (4).  
911 villosula Kr. Fvl. l. c.  
912 canescens Sharp. Fvl., 689.  
913 sordidula Er. Fvl. l. c.
- 914 zosteræ Th. Fvl., 690 et Suppl.  
\*\*\*  
915 intermedia Th. Fvl., 694.  
916 livida Muls. Rey. Fvl. l. c.  
917 putrida Kr. Fvl., 692.  
918 picipennis Mann. Fvl. l. c.  
919 cadaverina Ch. Bris. Fvl., 694.  
920 atramentaria Gyll. Fvl. l. c.  
921 laevana Muls. R. Fvl., 695 (5).  
922 marcida Er. Fvl., 696.

(1) † 897 a. \*proxima Kr., Nat., 314. — Germanie mér.  
(2) † 903 a. \*macilenta Sahlb., Ins. Fenn., I, 371. — Er., Gen., 137 et syn. — Laponie.  
(3) † 908 a. consanguinea\* Eppelsh., Stett. Ent. Zeit., 1875, 365. — Styrie.  
(4) † 910 a. \*pedicularia Heer, Fn. Helv., I, 325. — Suisse.  
(5) † 921 a. \*procera Kr., Nat., 307. — Thuringe.

- 928 amicula Steph. Fvl., 703.  
 929 liliputana Ch. Bris. Fvl., 704 (1).  
 930 puberula Sharp. Fvl. l. c.  
 931 ægra Heer. Fvl. l. c.  
 932 perexigua Sharp. Fvl., 705.  
 933 cæsula Er. Fvl. l. c.  
 \*\*  
 934 palleola Er. Fvl., 706.  
 935 minor Aubé. Fvl., 707 et *Suppl.*  
 936 subterranea Muls. R. Fvl. l. c.  
 937 testaceipes Heer. Fvl., 708.  
 938 dilaticornis Kr. Fvl., 709.  
 939 autumnalis Er. Fvl., 710 et *Suppl.*  
 940 basicornis Muls. R. Fvl. l. c.  
 941 obliterata Er. Fvl., 714 (2).  
 942 liturata Steph. Fvl., 712.  
 \*\*\*  
 943 depressicollis Fvl. l. c.  
 944 clancula Er. Fvl., 713.  
 945 patellata Fvl. l. c. (3).  
 946 pallidicornis Th. Fvl., 714.  
 947 nigritula Gr. Fvl., 715.  
 948 coriaria Kr. Fvl. l. c. (4).  
 949 trinotata Kr. Fvl., 716 (5).  
 950 nitidicollis Fairm. Fvl., 717.  
 951 contristata Kr. Fvl. l. c.  
 952 sodalis Er. Fvl., 718.  
 953 sericans Gr. Fvl., 719 (6).
- \*\*\*\*\*
- 954 subcavicola Ch. Bris. Fvl. l. c.  
 955 orcinia Fvl., 720.  
 956 myrmecobia Kr. Fvl., 721.  
 957 nitens Fuss. Fvl. l. c.  
 \*\*\*\*\*  
 958 gagatina Baudi. Fvl., 722.  
 959 divisa Mærk. Fvl. l. c.  
 960 palustris Kiesw. Fvl., 723.  
 961 nigricornis Th. Fvl. l. c.  
 962 angusticollis Th. Fvl., 724.  
 963 ravilla Er. Fvl., 725.  
 964 antennaria Fvl., 726.  
 965 corvina Th. Fvl. l. c. (7).  
 966 subtilis Scriba. Fvl., 727.  
 \*\*\*\*\*  
 967 laticeps Th. Fvl. l. c. et *Suppl.*  
 968 deformis Kr. Fvl., 728.
- \*\*\*\*\*
- 969 melanocephala Heer. Fvl., 729 (8).  
 970 brunnea Fabr. Fvl. l. c.  
 \*\*\*\*\*  
 971 Pertyi Heer. Fvl., 730 (9).  
 972 aquatica Th. Fvl., 731.  
 973 incognita Sharp. Fvl., 732 (10).  
 974 castanoptera Mann. Fvl. l. c.  
 975 succicola Th. Fvl., 733 (11).

- (1) 930 a. *Rebecca* Saulcy, *Ann. Ent. Fr.*, 1864, 439. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 240. — Syrie.  
 † 930 b. *\*foveicollis* Kr., *Nat.*, 296. — Thoms., *Skand. Col.*, IX, 282. — Scanie, Saxe.  
 (2) † 941 a. *\*picea* Mots., *Bull. Mosc.*, 1858, III, 254. — Angleterre.  
 (3) † 945 a. *\*diluticornis* Mots., *Bull. Mosc.*, 1858, III, 252. — Carniole.  
 (4) † 948 a. *\*lithuanica* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 577. — Hochh., l. c., 1862, III, 29. — Russie septentrionale.  
 (5) † 949 a. *\*hybrida* Sharp, *Trans. Ent. Lond.*, 1869, 196. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 237. — Écosse.  
 (6) † 953 a. *\*dispersa* Mots., *Bull. Mosc.*, 1860, II, 577. — Hochh., l. c., 1862, III, 30. — Russie, Sibérie.  
 (7) † 965 a. *\*impressa* Heer, *Fn. Helv.*, I, 335. — Genève.  
 (8) † 969 a. *\*variata* Harold, *Cat. Col.*, 543. — *sordida* Kr., *Nat.*, 268 (nec Marsh.). — Autriche.  
 (9) 970 a. *Judith\** Saulcy, *Ann. Ent. Fr.*, 1864, 631. — Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 216. — Syrie, Perse.  
 † 970 b. *\*dux* Peyron, *Ann. Ent. Fr.*, 1858, 418. — Caramanie.  
 (10) † 973 a. *\*hirtella* Heer, *Fn. Helv.*, I, 327. — Jura.  
 (11) † 975 a. *\*forticornis* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1849, I, 44 (nec Kr.). — Caucase (*Gen. dub.*).

- 976 valida Kr. Fvl., 734 (4).  
 977 subglabra Sharp. Fvl. l. c.  
 \*\*\*\*\*  
 978 eremita Rye. Fvl., 735 (2).  
 979 Aubei Ch. Bris. Fvl. l. c.  
 980 gemina Er. Fvl., 736.  
 981 meridionalis Muls. Rey. Fvl., 737.  
 \*\*\*\*\*  
 982 cava Fvl., 738.  
 \*\*\*\*\*  
 983 soror Kr. Fvl. l. c.  
 984 cavifrons Sharp. Fvl., 739.  
 985 analis Grav. Fvl. l. c.  
 \*\*\*\*\*  
 986 validiuscula Kr. Fvl., 740.
- 
- (1) + 976 a. *\*brunneipennis* Thoms., *OEfv. Vet. Ak. Forh.*, 1852, 135; *Skand. Col.*, III, 65. — Laponie.  
 (2) + 978 a. *\*fossigera* Hochh., *Bull. Mosc.*, 1872, III-IV, 111. — Kiew.  
 978 b. *curtipennis\** Sharp, *Trans. Ent. Lond.*, 1869, 173 (nec syn.—Mars., *L'Abeille*, 1871, VIII, 213). — Écosse.